

Chapter :- 11

उच्च पाठों में प्रकाश संश्लेषण

Date: _____


Page no: _____

Ques, प्रकाश संश्लेषण क्या है? इसके महत्व को समझाइए।

Ans.

प्रकाश संश्लेषण :-

समस्त हर पौधों सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और CO_2 का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं।



प्रकाश संश्लेषण एक भौतिक रासायनिक अभिक्रिया है इसमें मुक्त होने वाली ऑक्सीजन जल से निकलती है।

महत्व :- ① इस क्रिया के द्वारा कार्बनिक और अकार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण होता है।

② इस क्रिया के द्वारा प्राण वायु (O_2) का निर्माण होता है।

③ इस क्रिया के द्वारा वातावरण में ऑक्सीजन और CO_2 का सन्तुलन बना रहता है।

④ प्राकृतिक घरे कीयता पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन का संश्लेषण का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा होता है।

प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक :-
 ① सूर्य का प्रकाश :-

सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। यदि प्रकाश की गुणावस्था, तीव्रता व द्रिप्तकालिता के बीच अन्तर होता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है।

② CO_2 की सांद्रता :- प्रकाश संश्लेषण के लिए CO_2 महत्वपूर्ण घटक है यदि इसकी मात्रा कम या ज्यादा होती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है।

③ जल :- प्रकाश संश्लेषण के लिए जल का बहुत आवश्यक है अर्थात् जल की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है।

④ तापमान :- प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत अधिक व कम तापमान पर प्रभावित हो जाती है।

प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक :-
 1) सूर्य का प्रकाश :-

सूर्य का प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है। प्रकाश की उपस्थिति प्रकाश की गुणवत्ता, तीव्रता व द्रव्यमान के बीच अंतर होता है तो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित होती है।

2) CO_2 की सांद्रता :-
 प्रकाश संश्लेषण के लिए CO_2 आवश्यक है यदि इसकी मात्रा कम या ज्यादा होती है तो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित होती है।

3) जल :-
 प्रकाश संश्लेषण के लिए जल का होना बहुत आवश्यक है अतः जल की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित हो जाती है।

4) तापमान :-
 प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है बहुत अधिक व कम तापमान पर प्रभावित हो जाती है।

C_3 - पौधे

① इन पौधों में C_3 -चक्र चलता है। इसलिए इन्हें C_3 -पौधे कहते हैं।

② C_3 -चक्र में बनने वाला प्रथम ~~कार्बन~~ उत्पाद 3 कार्बन यौगिकों वाला होता है जैसे :- फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल

③ इस क्रिया में प्रकाशिय स्वसन होता है।

④ इसमें CO_2 और उच्च O_2 का स्थिरीकरण नहीं होता है।

⑤ C_3 पौधों में C_3 -चक्र पत्तियों के मीजोफिल भाग में चलता है।

C_4 - पौधे

इन पौधों में C_4 -चक्र चलता है। इसलिए इन्हें C_4 -पौधे कहते हैं।

C_4 -चक्र में बनने वाला प्रथम उत्पाद चार कार्बन यौगिकों वाला होता है। जैसे :- ऑक्सैलोन एसीटिक एसिड

इसमें प्रकाशिय स्वसन नहीं होता है।

इसमें CO_2 और उच्च O_2 हानि के कारण स्थिरीकरण होता है।

C_4 -पौधों में C_4 -चक्र पत्तियों के बॉन्डलशीथ में चलता है।

Ques चक्रीय और अचक्रीय फॉस्फोराइलेशन में अन्तर

चक्रीय फॉस्फोराइलेशन

i) इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एक चक्र के रूप में होता है।

ii) इसमें दो स्थानों पर ATP बनता है।

अचक्रीय फॉस्फोराइलेशन

इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह चक्र के रूप में नहीं होता है।

इसमें एक स्थान पर ATP बनता है।

- iii) इसमें PS-I भाग होता है। इसमें PS-I व PS-II दोनों भाग होते हैं।
 iv) इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है।
 v) इसमें $NADP^+$ होता है।
 vi) इसमें $NADPH$ नहीं बनता है। इसमें $NADPH$ के दो अनु बनते हैं।


प्रकाशिय अभिक्रिया	अप्रकाशिय अभिक्रिया
i) यह क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है।	यह क्रिया प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है।
ii) इसे हिल नामक वैज्ञानिक ने दिखाया था, इसलिए इसे हिल अभिक्रिया कहते हैं।	इसे "क्लेकमेन" नामक वैज्ञानिक ने दिखाया था, इसलिए इसे क्लेकमेन अभिक्रिया कहते हैं।
iii) यह अभिक्रिया क्लोरोफिल के ग्रैना में होती है।	यह अभिक्रिया क्लोरोफिल की स्ट्रोमा में होती है।
iv) इस क्रिया में CO_2 का स्थिरीकरण नहीं होता है।	इस क्रिया में CO_2 का स्थिरीकरण होता है।

Q. (C_3) केल्विन चक्र क्या है? समझाइए।

Ans. C_3 चक्र :- इस चक्र को मेल्बिस केल्विन नामक वैज्ञानिक ने समझाया था, इसलिए इसे

केल्विन चक्र कहते हैं। और इस चक्र में बनने वाला प्रथम उत्पाद " फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल " तीन कार्बन यौगिकों वाला होता है। इसलिए इसे C_3 चक्र कहते हैं। इस चक्र में एंजाइम कि क्रिया द्वारा ATP एवं NADPH आदि को ग्लूकोज में बदला जाता है। अर्थात् केल्विन चक्र को तीन अवस्थाओं में समझाया जा सकता है,

- i) कार्बोक्सीलेशन
- ii) अपकाश (Reduction)
- iii) पुनरुद्भावन (Regeneration)



1) कार्बोक्सीलेशन :-

सर्वप्रथम वातावरण की C_3 चक्र के दूसरे चरण में से जुड़ती है और तीन कार्बोक्सीलसरीक 1, 5 बाईकार्बोकेट का निर्माण हो जाता है यह प्रक्रिया "कार्बोक्सीलेशन संज्ञा" के द्वारा सम्पन्न होती है।

2) अपकाश / अपचयन (Reduction) :-

यह प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला होती है जिसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है इस चरण में प्रत्येक CO_2 के स्थिरीकरण के लिए दो $2 ATP$ अणुओं का उपयोग किया जाता है और $2-NADPH$ अणुओं का उपयोग किया जाता है। अर्थात् ग्लूकोज के एक अणु के निर्माण के लिए CO_2 के छः अणु की आवश्यकता होती है। इसके लिए C_3 चक्र को छः बार पूर्ण होना पड़ेगा।

3) पुनर्नवनीकरण (Regeneration) :-


अदि चक्र को बिना बाधा के जारी रखना हो तो CO_2 को ग्रहण करने वाला ग्लूकोज 1, 5 बाई कार्बोकेट की आवश्यकता होती है। प्रत्येक अणु को प्रवेश के लिए तीन $3-ATP$ तथा $2-NADPH$ अणुओं की आवश्यकता होती है। अर्थात् ग्लूकोज के एक अणु की रचना के लिए C_3 चक्र को 6 बार चक्कर चलना पड़ेगा।

Full form of NADPH → निकोटीन एमाइड एडिनिन डाई
न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट

⇒ C_4 - चक्र :- यह चक्र समान्यतः एक्वीजपत्री पौधों जैसे - गन्ना, मक्का, ज्वार आदि में पाया जाता है। परन्तु कुछ द्विवीजपत्री पौधों में भी देखने को मिलता है। इस चक्र में बनने वाला प्रथम उत्पाद चार कार्बन वाला यौगिक होता है इसलिए इस चक्र को C_4 - चक्र ~~कहते~~ ^(C4A) कहते हैं। इस चक्र को हेंच-स्लेक नामक वैज्ञानिकों ने दिया था इसलिए इसे हेंच-स्लेक चक्र के नाम से जानते हैं।

C_4 चक्र को क्लोरोप्लास्ट के मिजोफिल और बंडलशीथ में होता है इस चक्र में प्रथम वायुमंडलीय CO_2 को फॉस्फोरिडिल पाइरुवेट (PEP) द्वारा ग्रहण किया जाता है और कार्बोक्सीलेज एंजाइम द्वारा चार कार्बन यौगिक वाला ~~आ~~ ऑक्सेलो एसिटिक एसिड व मैलिक अम्ल तथा ए-पार्टिक अम्ल बनता है। मैलिक अम्ल के बाद यह किया पत्तियों के बंडलशीथ में प्रवेश कर जाती है। यहाँ पर मैलिक अम्ल का डी-कार्बो ऑक्सीलेशन होता है जिससे CO_2 बनती है यह CO_2 C_3 चक्र में प्रवेश कर जाती है। और C_3 का निमाण होता है और इसके बाद फॉस्फोरिडिल अम्ल बनता है जो पुनः पत्तियों के मिजोफिल भाग में प्रवेश कर जाता है। और PEP का निमाण हो जाता है जिससे ATP

AMP में बदल जाता है इस प्रकार से यह चक्र चलता रहता है।




निकाटि एमएसएस मंडलिन
डाई प्रुमिनामएसएस
कोमफुई

ग्लूकोस

Aspartic Acid

मिनिम

CO₂



ATP

AMP

PEP

CO₂

Aspartic Acid

PEP

PEP

CO₂

Important Point :-

- 1) प्रकाशिक अभिक्रिया हरितलवक के गुना में होती है।
- 2) ऑक्सीजन की खोज 1774 में जोसेफ प्रिस्टली ने की जिस प्राण वायु नाम दिया गया।
- 3) जोसेफ प्रिस्टली ने अपने प्रयोग पुदीने के पौधों पर किए।
- 4) स्टीफन हेल्स की पादप कार्यक्रिया के जनक कहले जाते हैं।
- 5) "इन्जेन हाउज" ने बताया की हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु शुद्ध करते हैं।
इन्होंने ने ही प्रकाश संश्लेषण का पहला समीकरण दिया।
- 6) जुलियस वॉन सैचर्स को founder of Experimental plant physiology कहा जाता है।
- 7) ब्लैकमैन ने सीमाकारी कारक का नियम दिया।
- 8) हरितलवक को कोशिका के अन्दर कोशिका कहते हैं और इसे अर्द्धस्वायत्त कोशिका अंग भी कहते हैं।
- 9) क्लोरोप्लास्ट में सुस्पष्ट क्रम विभाजन होता है।
- 10) एक परिपक्व हरितलवक में सामान्य 40-60 तक गुना पार जाते हैं।
- 11) क्लोरोफिल की संरचना "साइटोक्रोम" तथा "हिम" प्रोटीन के समान होती है।
- 12) PAR $\rightarrow$ photosynthetically Active Radiation
- 13) क्लोरोफिल अणु की संरचना टेडपोल के समान होती है।
- 14) क्लोरोफिल - A का सूत्र $[C_{55}H_{72}O_5, NH_4mg]$ है।
- 15) क्लोरोफिल - B का सूत्र $[C_{55}H_{72}O_6, NH_4mg]$ है।

- 16) क्लोरोफिल में चार पाइरोल रिंग पाई जाती हैं।
- 17) क्लोरोफिल के मध्य में Mg का एक परमाणु होता है।
- 18) कैरोटिनोइड्स नारंगी-पीले रंग के होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। i) कैरोटिन ii) जैन्थोफिल
- 19) कैरोटिन नारंगी-लाल होते हैं। इसका सूत्र $[C_{40}H_{56}]$ होता है।
- 20) कैरोटिन गाजर में प्रचुर मात्रा पाया जाता है।
- 21) पके हुए टमाटर तथा लाल मिर्च में "लाइकोपीन" कैरोटिन पाया जाता है।
- 22) जैन्थोफिल पीले रंग के वर्णक होते हैं।
- 23) इसका सामान्य सूत्र $[C_{40}H_{56}O_2]$ होता है।
- 24) ल्यूटिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जैन्थोफिल है।
- 25) रसायन परासरणीय परिकल्पना [Chemo Osmotic Hypothesis] ब्रिटिश के एक वैज्ञानिक "पिटर मिचेल" ने दी थी। इसके लिए उन्हें 1978 नोबल पुरस्कार दिया था।
- 26) C_3 चक्र में C_3 को ग्रहण करने वाला ग्राही राइबुलोज 1,5 बिस फास्फेट है।
- 27) स्वविस्फोटक संसार में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला एन्जाइम है।
- 28) कैंच / कौज शारीरिकी C_4 - पौधों में पाई जाती है।

- 28) बॉडलशीथ में खनिजों का एन्जाइम भरपूर मात्रा में पाया जाता है,
- 29) यह एन्जाइम CO_2 व O_2 को दोनों में जुड़ सकता है इसलिए इसे खनिज कहते हैं,

- 30) C_2 चक्र में बनने वाला प्रथम उत्पाद "फॉस्फोग्लूकोलेट" होता है जो दो कार्बन यौगिकों वाला होता है,
- 31) प्रकाश अवसन की क्रिया में तीन यौगिकों अंश भाग लेते हैं — i) क्लोरोफिल ii) परऑक्सीसीम साइटोक्रोम
- iii)