

पादप वृद्धि परिवर्धन

Ques पादप वृद्धि क्या है ?

Ans मिलर के अनुसार वृद्धि वह क्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप किसी जीव या उसके अंगों में होने वाले अनुक्रमणीय परिवर्तन जैसे भार आयतन व आकार, वृद्धि में किसी भी जीव की लम्बाई में, भार में व अक्षर में वृद्धि होता रहता है व यह वृद्धि कई चरण होते हैं -

- 1) विभज्योत्कीय
- 2) दीर्घीकरण
- 3) परिपक्व

वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक →

i) प्रकाश → सभी हर पेड़-पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं जो वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है।

ii) जल → पौधे की वृद्धि के लिए जल अतिमहत्वपूर्ण घटक है क्योंकि जीव द्रव्य का अधिकांश भाग जल होता है अर्थात् जल की उपस्थिति में ही पौधे वृद्धि कर सकते हैं।

iii) CO_2 की सांद्रता :- प्रकाश संश्लेषण के लिए CO_2 का होना बहुत आवश्यक है इसकी अनुपस्थिति में CO_2 प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है।

iv) O_2 की सांद्रता :-

ऑक्सीजन का होना बहुत आवश्यक है। आ: ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पौधे बढ़ नहीं कर सकते हैं।

v) PH की सांद्रता :-

ज्यादा होती है तो यदि मृदा में PH कम या ज्यादा होता है तो बढ़ने का दर प्रभावित हो जाती है।

Q. परिवर्धन क्या है ? (Development) के के गोवा के
अ. परिवर्धन (विकास) दो प्रक्रियाओं के के गोवा के
कहा जाता है जिसमें पौधे में जोर विभेदन
शामिल होती है। पौधे में लम्बाई और भार में
वृद्धि होती है। तथा विभेदन में कोशिका या
अंगों में परिपक्वता आती है।

Q. वृद्धि दर क्या है ? वृद्धि दर कितने प्रकार की होती है ?

अ. समय के साथ-साथ प्रति इकाई के दौरान
वृद्धि को वृद्धि दर कहते हैं।

वृद्धि दर दो प्रकार की होती है -

1) अंक गणितीय वृद्धि दर :-

अंक गणितीय वृद्धि दर में समझी विभाजन के बाद केवल एक पुत्री कोशिका लगातार विभाजित होती रहती है और दूसरी कोशिका परिपक्व होती रहती है इसे अंक गणितीय वृद्धि कहते हैं।

अंक गणितीय वृद्धि में सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त होती है।
 सूत्र $\rightarrow L_t = L_0 + r t$


जहाँ — L_t = समय t के समय लम्बाई
 L_0 = समय शून्य के समय लम्बाई
 r = वृद्धि दर दीर्घकाल प्रति इकाई समय

2) ज्यामितीय वृद्धि दर : —

इस प्रकार की वृद्धि दर में दोनो संतति कोशिकाएँ लगातार-लगातार विभाजित होती रहती हैं। प्रारंभ में वृद्धि दर धीमी होती है तथा बाद में बहुत तीव्र होती है। इसलिए इसे चर घाताकी वृद्धि दर भी कहते हैं, इस वृद्धि दर में सिग्मोइड या S-आकार का ग्राफ प्राप्त होता है।

सूत्र $\rightarrow W_t = W_0 e^{rt}$ W_t = अन्तिम आकार, t = समय
 r = वृद्धि दर, W_0 = प्रथम आकार
 e = स्वभाविक लघुगणक का आ. W_0 =

3. सिग्मोइड वक्र (ग्राफ) क्या है ?
 यह ज्यामितीय वृद्धि दर के अन्तर्गत कने वाला वक्र है, यदि समय और वृद्धि के मध्य ग्राफ रखा जाए तो हमें एक S-आकार का ग्राफ प्राप्त होता है। जिसे सिग्मोइड वृद्धि वक्र कहते हैं।



प्लास्टिसिटी :-
 पौधे पर्यावरण के प्रभाव के कारण या जीवन के विभिन्न चरणों में विभिन्न-विभिन्न पदों का अनुसरण करते हैं ताकि विभिन्न तरह की संरचना को गठन कर सके। पौधे की इस क्षमता को प्लास्टिसिटी कहते हैं।

उदा. - कवच, धनियाँ, लकड़-पट्ट

Ques पादप हार्मोन कौनसे होते हैं तब यह कितने प्रकार के होते हैं उनके कार्य लिखिए ?

ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनके द्वारा पादपों के शरीर की सम्पूर्ण जैविक क्रियाएँ नियंत्रित होती हैं पादप हार्मोन कहलाते हैं।

पादप हार्मोन निम्न प्रकार के होते हैं -

1) ऑक्सिजन / ऑक्सिन :-

यह एक पादप वृद्धि हार्मोन है, जिसके द्वारा जड़ व तने की लम्बाई में वृद्धि होती है। यह हार्मोन जड़ व तने के शीर्ष भागों पर पाया जाता है। ऑक्सिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम क्रोगेन / हेमन व स्मिथ ने किया था परन्तु इस हार्मोन की खोज F.W. Went ने की। यह पौधे की साँकुर कोल से

उदा. -

उदा. —

IAA	(इण्डोल एसिडिक एसिड)
IBA	(इण्डोल ब्यूटिरिक एसिड)
2-4D	(2-4 डाइक्लोरो फिनाक्सी एसिडिक एसिड)
NAA	(नैफथैलिन एसिडिक एसिड)

कार्य :-

- ① यह पौधों की लम्बाई बढ़ाने में सहायक होता है।
- ② यह जड़ों के विकास को प्रेरित करता है।
- ③ यह स्वरूपतत्त्वों को नाश करता है।
- ④ आक्जिन हार्मोन के द्वारा बीज रहित फूलों का निमग्न किया जाता है जिसे अनिषेक फलन कहते हैं।

2) जिबरेलीन :-

जिबरेलीन हार्मोन की खोज डॉ. कुरोबोवा नामक वैज्ञानिक ने जिबरेला फ्यूजीकुरोई नामक सड़े लकड़ से की थी। यह हार्मोन मुख्यतः तने की लम्बाई को बढ़ाता है जिबरेलीन हार्मोन निम्न प्रकार के होते हैं -

GA₁, GA₂, GA₃

- कार्य :-
- ① इस हार्मोन के द्वारा मुख्यतः तने के पत्तों की लम्बाई में वृद्धि होती है।
 - ② जिबरेलीन हार्मोन का उपयोग वृक्ष उद्यान में किया जाता है।
 - ③ इस हार्मोन के द्वारा अमूर के लवंगुस डकल की लम्बाई बढ़ाने में कबूते हैं।

- (4) जिवरेलीन हार्मोन सेब जैसे फलों को लम्बा बनाने का कार्य करता है, ताकि वह उचित रूप से सके। जिससे बाजार में उचित दाम बचाता है बाए
- (5) जिवरेलीन द्वारा बीज की प्रशुति काल को कम किया जा सकता है,
- (6) जिवरेलीन के द्वारा बिना निषेचन के ही फल प्राप्त कर सकते हैं।

Note :- गन्ने की खेती में जिवरेलीन छिड़कने पर तना की लम्बाई बढ़ती है, इससे बीज 20-25 प्रति एकड़ ज्यादा उपज बढ़ जाती है।

3) साइलोकाइन :-

इस हार्मोन को सबसे पहले F- स्कूला तथा उनके सहयोगियों ने तम्बाकू के पौधों की फल तथा पर्वान्धियों से की थी। सन 1955 में मिलर तथा उनके साथियों ने इस हार्मोन का क्रिस्टलीकरण किया था। और इसे कौनटिन नाम दिया। यह हार्मोन मुख्यतः कौशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है।

कार्य :- (1) कौशिका विभाजन में सहायक होता है।

(2) पौधों की लम्बाई को नियंत्रित करता है व तने की मोटाई को बढ़ाता है।

(3) यह पत्तियों, फलों व पुष्प के विलगन को बढ़ाता है।

(4) यह मूल रोम के निर्माण तथा बीजों के अंकुरण को प्रेरित करता है।

5) यह पौधों में नर पुष्पों की संख्या में कमी तथा मादा की पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है।

4) एथिलिन हार्मोन :-

यह एक मात्र गैसीय पादप हार्मोन है। इस हार्मोन को वन 1910 में H.M. कजिने ने पके हुए अनंतरो से निकाला। उन्होंने देखा कि पके हुए अनंतरो के छे पास कच्चे केले रखे वो जो शीघ्रता से ही पक गये। इन अनंतरो से एक वाष्पशील तत्व एथिलिन निकाला जा जिससे पादप हार्मोन के नाम से जाना गया। इसका रासायनिक सूत्र C_2H_4 या $CH_2=CH_2$ है।

कार्य :-

- 1) यह फूलों को पकाने में सहायक होता है।
- 2) फूलों एवं फलियों को तिलगान को खाता है।
- 3) यह फले हुए तनों के अग्र भाग पर कसिकाओं के निर्माण को रोकता है।
- 4) कृषि में रासायनिक इस्तेमाल होने वाला हार्मोन एथिलिन है।

उदा. — एथिफॉन

5) एब्सिसिक अम्ल :-

यह तनाव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। यह पौधों में वृद्धि निरोधक का कार्य करता है। इसकी खोज कॉन एवं एडिकोर्ट ने 1960 में की थी।

(ABA)

Date: _____ Page no: _____

इन्होंने तीन वृद्धि निरोधक यदार्थों का शुद्धिकरण किया जैसे - निरोधक - 3, विलगन - II, डोएमिन बाद में यह तीनों रासायनिक पदार्थों से समान पाये गये जिन्हें एब्सीरिक अम्ल कहा गया।

कार्य :- ① यह पौधे की असमान्य वृद्धि को रोकता है।

② यह हार्मोन बीज व कसिका की प्रभुति को बढ़ा देता है।

③ यह हार्मोन विलगन परत को क बनाता है।
④ वसन्तीकरण, पुष्पन व बीज उत्पन्न की किया को नियंत्रित करता है।

Q निम्न को परिभाषित कीजिए :-

① विभेदन [Differentiation] :- कुछ विभेद्योत्कीय कोशिका विभाजित होकर कुछ कोशिकाएँ परिपक्व कोशिकाओं में बदल जाती हैं जो अलग दिखाई देने लगती हैं। इस क्रिया को विभेदन कहते हैं। इन कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है।
उदा. - एक बाह्यीय तंतु की कोशिका

② निविभेदन [Redifferentiation] :- जो परिपक्व कोशिका है उसमें विभाजन की क्षमता वापस आ जाती है तो उसे निविभेदन कहते हैं जैसे -
अन्तरपुत्रिय कॅन्सिपम, कार्क कॅन्सिपम

3) पुनः निविभेदन [Redifferentiation] :- ऐसी निविभेदन कोशिका जो दूसरी से अलग दिशाई देती है और परिपक्व कोशिका में बदल जाती है। पुनः निविभेदन कहलाता है।

उदा. - अर्बुद (Tumour)

Imp. Point -

- ① PGR का पूरा नाम :- plant Growth Regulator
- ② हार्मोन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्टाबिन्ग नामक वैज्ञानिक ने 1906 में किया था।
- ③ फाइटो हार्मोन शब्द को Thimann ने दिया था।
- ④ डार्विन ने "गुरुत्वाकर्षण पर प्रकाश का प्रभाव" अपनी पुस्तक *Power of movement in Plant* में लिखा था।
- ⑤ डार्विन ने अपने प्रयोग "कनारी घास" पर किये थे।
- ⑥ "पुष्पन" से पहले पौधों के अन्तः पुर्व में वृद्धि होना "बोलिंग प्रभाव" कहलाता है। जो जिबरेलीन हार्मोन के कारण होता है, जैसे -

- पत्ता गोभी, चूकंदर
- ⑦ गारियल के दूध में साइटोकाइनिन हार्मोन पाया जाता है।
 - ⑧ पामेलिन का उपयोग सब्जियों का आकार बढ़ाने के लिए किया जाता है।

- (9) स्माइलकैनिन हार्मोन को मक्का के बीज से
 हटाया गया जिसे जियलिन कहा गया।
 (10) फलों के फटने पर श्वसन गति बढ़ जाती है,
 इस श्वसन की बढ़त को क्लाइमैटिक
 श्वसन कहते हैं।
 (11) फ्लोरीजन हार्मोन एक पुष्पन हार्मोन होता है
 इसकी खोज 1936 में फेजलैन नामक वैज्ञानिक
 ने की थी।

बीज प्रसुप्ति (Seed Dormancy) :- बीज पौधे का
 जन्म दाता होता है क्योंकि इनका निमग्न करने वाला
 भ्रूण बीज के अन्दर होता है, बीज अकुंठित
 होकर नये पौधे का निष्कर्ष करता है। पौधे
 में बीज बनने के बाद कोई भी बीज तुरंत अकुंठित
 नहीं होता है, परन्तु बीज बनने और अकुंठन
 के बीच एक निश्चित समयान्तराल का होना बहुत
 आवश्यक होता है इसे प्रसुप्त काल / सुप्त अवस्था
 या बीज प्रसुप्ति कहते हैं।