

Chapter → 2

जीव जगत का वर्गीकरण

✓ 20. पाँच जगत वर्गीकरण क्या है?

30. 1969 में "R.H. Whittaker" ने जीवों का पाँच जगत वर्गीकरण दिया है, उन्होंने स्वसार के सभी जीवों को पाँच जगत में बाँटा।

- ① मोनरा जगत
- ② प्रोटिस्टा जगत
- ③ फंफू जगत
- ④ ~~पौध~~ पौध जगत
- ⑤ ~~पशु~~ पशु जगत

● मोनरा जगत : — इसमें सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है, जैसे — जीवाणु, साइनो जीवाणु व माइक्रोप्लाज्मा आदि।

● प्रोटिस्टा जगत : — इस जगत में सभी एककोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को रखा गया है।
जैसे — अमीबा, पैरामिथियम और यूग्लिना।

● फंफू जगत : — इसमें सभी विषमपोषी जीवों को रखा गया है।
जैसे — सभी फंफू

● पादप जगत :-

पादप जगत में सभी यूकेरियोटिक हीरतसम्पन्न युक्त पादप होते हैं यह स्वपोषी, परपोषी तथा विषमपोषी प्रकार के हो सकते हैं।
जैसे - सभी पौधे,

● जन्तु जगत :-

इस जगत के सभी जीव यूकेरियोटिक बहुकोशकीय होते हैं तथा यह विषमपोषी होते हैं।
जैसे :- सभी जन्तु ।

Ques मोनेरा जगत के सामान्य लक्षण लिखिए।

- ① मोनेरा जगत में सभी जीवाणुओंको रखा जा गया है।
- ② इस जगत के सभी जीव एककोशकीय या बहुकोशकीय होते हैं।
- ③ इस जगत के जीवों में अल्पीकक्षीत केन्द्रक पाया जाता है।
अर्थात् केन्द्रक के चारों तरफ केन्द्रकीय झिल्ली नहीं पाई जाती है।
- ④ इसके DNA में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है।
- ⑤ मोनेरा जगत के जीवों में लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है।
- ⑥ इस जगत के जीवों में केन्द्रक के अन्दर केन्द्रिका नहीं पाई जाती है।

⑥ इस जगत के जीवों में कोई भी विकसित कोशिका अंग नहीं पाये जाते हैं,

Ques जीवाणु क्या हैं व इनके सामान्य लक्षण और यह कितने प्रकार के होते हैं,

Ans जीवाणु ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारी नज़र औरों से दिखाई नहीं देते हैं जिनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी (माइक्रोस्कोप) का प्रयोग किया जाता है। जीवाणु हमारे लिए लाभदायक और हानिकारक हो सकते हैं, यह सभी स्थानों पर पाये जाते हैं,

जीवाणु की खोज सर्वप्रथम "एन्टोनी वॉन ल्यूवेन हॉक" तथा जीवाणु शब्द का प्रयोग सबसे पहले एड्रियन वॉन लैवनीक ने दिया था। जीवाणु सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं,

① आर्की बैक्टीरिया ② यूबैक्टीरिया

* जीवाणु के सामान्य लक्षण :-

- ① सभी जीवाणु प्रोकेरियोटिक होते हैं,
- ② इनके केन्द्र के चारों तरफ केन्द्रिय झिल्ली नहीं पाई जाती है,
- ③ यह स्वपोषी और विषमपोषी प्रकार के होते हैं,
- ④ यह जीवों के लिए लाभदायक और हानिकारक होते हैं,
- ⑤ इनकी कोशिका भित्ति पेक्टोग्लाइकोन की बनी होती है,

Que

आर्की बैक्टिरिया क्या हैं ?

Ans.

इसे प्राचीनतम जीवाणु जो समुद्र की गहराई में पाये जाते हैं यह जीवाणु अधिक तापमान लवणता अधिक अम्लता वाले स्थानों पर पाये जाते हैं। इन जीवाणुओं को जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है।

यह तीन प्रकार के होते हैं।

1) मैथेनोजेन्स 2) हेलोफिलस 3) थर्मोएसिडोफिलस

1)

मैथेनोजेन्स :-

इसे आर्की बैक्टिरिया जो मेथेन गैस को उत्सर्जित करते हैं उसे मैथेनोजेन्स कहते हैं। यह बैक्टिरिया पशुओं के आमाशय में पाये जाते हैं जो सेल्युलोज का पाचन करते हैं।

2)

हेलोफिलस :-

इसे आर्की बैक्टिरिया जो अधिक लवणता वाले स्थानों पर पाये जाते हैं उसे हेलोफिलस कहते हैं।

3)

थर्मोएसिडोफिलस :-

इसे आर्की बैक्टिरिया जो अधिक अम्लता तथा अधिक तापमान पर जीवित रह सकते हैं उन्हें थर्मोएसिडोफिलस कहते हैं।

Ques

आकार के आधार पर जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं ?

Ans

आकार के आधार पर जीवाणु निम्न चार प्रकार के होते हैं।

- ① गोलाकार जीवाणु (कोकस) ② छड़ के आकार के जीवाणु (बैसिलस)
- ③ कमा के आकार के जीवाणु ④ सर्पिलाकार जीवाणु ।

॥

गोलाकार जीवाणु (कोकस) :-


ऐसे जीवाणु जिनका आकार गोल होता है उन्हें गोलाकार (कोकस) जीवाणु कहते हैं,

गोलाकार जीवाणु निम्न प्रकार के होते हैं,

①

मोनो कोकस :-


जब गोलाकार जीवाणु संख्या में एक होता है तो उसे मोनो कोकस कहते हैं,



②

डिप्लोकोकस :-


जब गोलाकार जीवाणु संख्या में दो होते हैं तो उसे डिप्लोकोकस कहते हैं,



(iii)

टेट्राकोक्स :-

जब गोलकार जीवाणु संख्या में चार होते हैं तो उसे टेट्राकोक्स कहते हैं।



(iv)

स्ट्रेटोकोक्स :-


जब गोलकार जीवाणु एक श्रृंखला के रूप में पाये जाते हैं तो उसे स्ट्रेटोकोक्स कहते हैं।



(v)

स्टेफाइलोकोक्स :-


जब गोलकार जीवाणु अंगूर के गुच्छे के समान दिखाई देते हैं तो उसे स्टेफाइलोकोक्स कहते हैं।



(vi)

सारसिना :-

जब गोलकार जीवाणु घन के आकार का दिखाई देता है तो उसे सारसिना कहते हैं।



(2) छड़ के आकार के जीवाणु :- (बैसिलस) :-

ऐसे जीवाणु जिनका आकार छड़ के समान होता है उन्हें छड़ाकार जीवाणु कहते हैं।

यह निम्न प्रकार के होते हैं,

(i) मोनो बैसिलस :-

जब छड़ के आकार का जीवाणु संख्या में एक होता है तो उसे मोनो बैसिलस कहते हैं।



(ii) डिलो बैसिलस :-

जब छड़ के आकार का जीवाणु संख्या में दो होते हैं तो उसे डिलो बैसिलस कहते हैं।



(iii) स्ट्रेप्टो बैसिलस :-


जब छड़ के आकार का जीवाणु संख्या में एक श्रृंखला के रूप में पाये जाते हैं तो उसे स्ट्रेप्टो बैसिलस कहते हैं।



(iv) पैसिलेड बैसिलस :-

जब छड़ के आकार के जीवाणु कितानों के पन्ने के समान एक के ऊपर एक


व्यवस्थित होते हैं तो उसे पैलिसेड वेसिलस कहते हैं।



(3) कोमा के आकार के जीवाणु :- जब जीवाणु का आकार कोमा के समान होता है, जैसे विब्रियो कोलेरा।



(4) सर्पिलाकार जीवाणु :- ऐसे जीवाणु जिनका आकार सर्पिलाकार होता है उसे जैसे :- स्पाइरिलस



Que कक्षाभिकाओं के आधार पर जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं?

Ans कक्षाभिकाओं के आधार पर जीवाणु निम्न प्रकार के होते हैं,

- ① एद्राइकस :- ऐसे कशाभिका रहित जीवाणु जिनमें कोई भी कशाभिका नहीं पाई जाती है उसे एद्राइकस कहते हैं।
उदा. :- लेक्टो बैसिलस , पाश्चुरेला



- ② मोनोद्राइकस :- ऐसे जीवाणु जिनमें केवल एक कशाभिका पाई जाती है उन्हें मोनोद्राइकस कहते हैं।
उदा. = विषिया कोमेरा




- ③ एम्फिट्राइकस :- ऐसे जीवाणु जिनके दोनों सिरों पर एक एक कशाभिका पाई जाती है उसे एम्फिट्राइकस कहते हैं।
उदा. - नाइट्रोसोमोनास




- ④ लोफोद्राइकस :- ऐसे जीवाणु जिनके एक सिरे पर कशाभिकाओं का गुच्छा पाया जाता है।


उसे लोफोट्राइक्स कहते हैं।
उदा. — स्पाइरिलम



⑤ सिफिलोट्राइक्स :- ऐसे जीवाणु जिनके दोनों तरफ
जुशाभिकाओं का गुच्छा पाया जाता है उसे
उसे सिफिलोट्राइक्स कहते हैं।
उदा. — स्ट्रिडोमोनास



⑥ पेरीट्राइक्स :- ऐसे जीवाणु जिसके सम्पूर्ण शरीर पर
जुशाभिकाएँ पाई जाती हैं उसे पेरीट्राइक्स कहते हैं।
उदा. — "इन्डिचरीचिया कोल्बि"



(रंगना)
अभिरंजन के आधार पर जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं।

अभिरंजन के आधार पर जीवाणु दो प्रकार के होते हैं,
① ग्राम धनात्मक जीवाणु ② ग्राम ऋणात्मक जीवाणु

① ग्राम धनात्मक जीवाणु :-

ऐसे जीवाणु जो ग्राम स्टेन

को ग्रहण कर लेते हैं और रंगीन दिखाई देते हैं।
 उन्हें ग्राम धनात्मक जीवाणु कहते हैं।
 उदा. - बैसिलस, क्लस्ट्रिडियम

② ग्राम त्रिणात्मक जीवाणु :- ऐसे जीवाणु जो ग्राम स्टैन को ग्रहण नहीं करते और रंगीन नहीं हो दिखाते।
 उन्हें ग्राम त्रिणात्मक जीवाणु कहते हैं।

उदा. - विब्रियो कोलेरा, सालमोनेला टाइफी।

③ ग्राम धन धनात्मक और ग्राम त्रिणात्मक जीवाणु में
 अन्तर निम्नलिखित ५

ग्राम धनात्मक


ग्राम त्रिणात्मक

i) ऐसे जीवाणु जो ग्राम स्टैन को ग्रहण कर लेते हैं और गुलाबी रंग के दिखाई देते हैं। <u>ग्राम धनात्मक</u> जीवाणु कहलाते हैं।	ऐसे जीवाणु जो ग्राम स्टैन को ग्रहण नहीं करते तथा यह बैंगनी रंग के दिखाई देते हैं। <u>ग्राम त्रिणात्मक</u> जीवाणु कहलाते हैं।
ii) इनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है।	इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है।
iii) इनकी कोशिका भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकॉन अधिक मात्रा में पाया जाता है।	इनकी कोशिका भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकॉन की मात्रा कम होती है।
iv) इसमें टिकोडक अम्ल की मात्रा अधिक होती है।	इसमें टिकोडक अम्ल की मात्रा कम होती है।
v) उदा. - बैसिलस, क्लस्ट्रिडियम	उदा. - विब्रियो कोलेरा, सालमोनेला टाइफी।

Que साइनो जीवाणु नील हरित शैवाल क्या है ?
इसके प्रमुख लक्षण लिखिए ?

Ans साइनो जीवाणु :- यह एक तंतुमय एककोशकीय या बहुकोशकीय ग्राम ऋणात्मक जीवाणु होता है जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण इसका रंग नीला हरा होता है इसलिए इसे नील हरित शैवाल के नाम से जाना जाता है।

कुछ साइनो जीवाणु जैसे - नोस्टोक, एनाबिना प्रदूषित जल में पाये जाते हैं।



* साइनो जीवाणु के लक्षण :-

- ① इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण इसका रंग नीला हरा होता है।
- ② यह प्रकाश संश्लेषण करते हैं तथा स्वपोषी होते हैं।
- ③ यह तंतुमय होता है, यह अलवणीय जल तथा समुद्री जल अथवा स्थल पर पाया जाता है।
- * ④ साइनो जीवाणु में कुछ कोशिका कुलकर बनी हो जाती हैं जो प्रजनन का कार्य करती हैं, हेटेरोसिस्ट कहलाती हैं।

- ⑤ इनकी कोशिकाओं के चारों तरफ म्यूकोपेक्टाइड का बना हुआ चिपचिपा आवरण पाया जाता है।
- ⑥ इनकी कोशिका भित्ति सेल्युलोज की बनी होती है।

* जीवाणु के आर्थिक महत्व :-

① कृषि के क्षेत्र में :-

कुछ जीवाणु जैसे राइजोबियम फलीदार पौधों की जड़ों की गहानों में पाये जाते हैं जो प्रकृति में पड़ जाने वाली नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके भूमि की उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हैं।

② डेयरी उद्योग में :-

कुछ जीवाणु जैसे लेक्टोबैसिलस का उपयोग डेयरी उद्योग में दूध से दही, पनीर बनाने में किया जाता है।

③ प्रतिजैविक दवाइयों के निर्माण में :-

जीवाणुओं का उपयोग औषधि उद्योगों में प्रतिजैविक दवाइयों बनाने में किया जाता है।

④ एल्कोहल उद्योगों में :-

कुछ जीवाणु जैसे "एसीटोबैक्टर एसरीटस" का उपयोग एल्कोहल बनाने में किया जाता है।

⑤ वातावरण को साफ रखने में :-

कुछ जीवाणु प्रकृति में अपरिणत अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन कर रहे हैं जिससे वातावरण साफ बना रहता है।

Ques

माइकोप्लाज्मा क्या है? इसके लक्षण लिखिए?

Ans

यह ऐसे सूक्ष्मजीव हैं जो जीवों में रोग पैदा कर सकते हैं। इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। यह सबसे छोटी जीवित कोशिका है जो ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकती है। माइकोप्लाज्मा को जीवाणु और विषाणु के मध्य में की संयोजक कड़ी माना जाता है।

माइकोप्लाज्मा की खोज नोकार्ड एवं रॉक्स नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसे PLO के (Pleuro ~~is~~ Pneumonia like organism) के नाम से जाना जाता है।

विशेष बिन्दु :-

- ① सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा (PPLo) को कहा जाता है।
- ② माइकोप्लाज्मा जीवाणु और विषाणु के मध्य की संयोजक कड़ी है।
- ③ माइकोप्लाज्मा पृथ्वी पर ऑक्सीजन पैदा करने वाले प्रथम जीव है।
- ④ जीवाणुओं में श्वसन की क्रिया मिजोसोम के द्वारा होती है।

- ⑤ जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लायकॉन की बनी होती है,
- ⑥ राइमोबियम जीवाणु को सहजीवी जीवाणु है,
- ⑦ एजोबैक्टेरिअ व क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु स्वतंत्र जीवि जीवाणु हैं।

* प्रोटिस्टा जगत *

प्रोटिस्टा जगत क्या है? इसके लक्षण लिखिए।
 प्रोटिस्टा जगत में सभी एककोशकीय यूकेरियोटिक जीवों को रखा गया है। इस जगत को वर्गीकरण का छठा छात (इस्टेब्लिशमेंट) कहा जाता है।

प्रोटिस्टा जगत के लक्षण :-

- ① यह एककोशकीय यूकेरियोटिक होता है।
 - ② इस जगत के सभी जीवों में विकसित केन्द्रक पाया जाता है।
 - ③ इस जगत के जीवों में सभी विकसित कोशिका अंग पाये जाते हैं।
 - ④ प्रोटिस्टा जगत के जीवों में कशाश्लिषा एवं सिलिसिया पाये जाते हैं। (पदमात्र)
 - ⑤ प्रोटिस्टा जगत के जीवों में प्रजनन लैंगिक और अलैंगिक विधियों के द्वारा होता है।
 - ⑥ प्रोटिस्टा जगत के जीवों में सामान्यतः कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, परन्तु यदि पाई जाती है, तो वह सेल्युलोज की बनी होती है।
- उदा. ⇒ अमीबा, पैरामिडियम एवं यूग्लीना।

Que

प्रोटिस्टा जगत को कितने भागों में बाँटा गया है?

Ans

प्रोटिस्टा जगत को निम्न भागों में बाँटा गया है,

- ① फाइसोफाइट ② डाइनोफ्लैमिनेट ③ युग्लिनाइड
④ अवपंक फवक ⑤ प्रोटोजोआ

①

फाइसोफाइट :-

इस समूह में डायटम्स आते हैं जिन्हें स्वर्ण जैवाल भी कहा जाता है इनमें क्रोरोफिल तथा C पाया जाता है, इसके कारण इनका रंग हरा भुनहरा होता है। यह मुख्यतः समुद्री जल और स्वच्छ जल दोनों में पाये जाते हैं। डायटम्स का शरीर साबुनदानी के आकार का होता है। इसमें दो भित्तियाँ पाई जाती हैं। ऊपर वाली भित्ति को डीपिथिका तथा निचली भित्ति को हाइपोथिका कहते हैं जो सीलिका युक्त कठोर पदार्थ की बनी होती है। इन दोनों भित्तियों के मध्य में वस्रीय पदार्थ भरा होता है जिसके कारण यह समुद्र की सतह पर तैरता रहता है।

जब डायटम्स की मृत्यु हो जाती है तो बड़ी संख्या में इसकी कोशिका भित्ति के अवशेष समुद्र की तली में करोड़ों वर्षों से जमा हो जाते हैं, जिसे डायटमी मृदा / डायटमी मृत्तिका कहते हैं। इसका उपयोग पोलिथी करने तथा सिस्पा के छानने में किया जाता है।

डाइनोफ्लैगिलेट :-

यह ऐसे जिवधारी होते हैं जो मुख्यतः समुद्र में पाये जाते हैं प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इनमें कणों की उपस्थिति के कारण यह नीले, पीले, भूरे हरे अथवा लाल दिखाई देते हैं। इनमें दो कक्षाभिकाएँ पाई जाती हैं इसीलिए इनका नाम डाइनोफ्लैगिलेट रखा गया है। इनको अग्नि कोवलन भी कहा जाता है।

इनके शरीर में एक कक्षाभिका सम्भवत होती है, जब इनकी संख्या में विस्फोट होता है तो समुद्र में लाल तंगे फैला दिखाई देती है। इनके कुछ विशेष पदार्थ निकलता है जिससे बड़ी संख्या में समुद्री जीव मर जाते हैं।
उदा. गोनियोलेक्स।

युगिलनोइड :-

इसके आदिवासी जीव स्वच्छ जल में पाये जाते हैं। इनमें कोशिका भित्ति के स्थान पर प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पाई जाती है, जिससे पैलिफिलम कहा जाता है। इसमें भी दो कक्षाभिकाएँ पाई जाती हैं एक कक्षाभिका छोटी तथा दूसरी कक्षाभिका बड़ी होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह अपना भोजन स्वयं बना लेता है और जब प्रकाश नहीं होता है तो यह परपोषी की तरह व्यवहार करता है।
उदा. - युगिलना।

नोट :- युगिलना को पादप तथा जन्तु के मध्य की समोजक कड़ी कहा जाता है।

अवपंक कवक :-

अवपंक कवक सतपेयी होते हैं। यह पेड़ - पौधों की सड़ी हुई लहनियों तथा पत्तियों के चारों तरफ घिपघिपे पदार्थ के रूप में पाये जाते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में एक समूह बनाते हैं जो कई फीट लम्बा होता है जो एककोशिकीय होता है। विपरीत परिस्थितियों में बीजाणुओं का निर्माण करते हैं,

प्रोटोजोआ :-

सभी प्रोटोजोआ परपेयी होते हैं जो दूसरे जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, प्रोटोजोआ को चार समूह में बाँटा गया है,

- | | |
|------------------------|----------------------|
| ① अमीबिय प्रोटोजोआ | ② कशाशिकीय प्रोटोजोआ |
| ③ पक्षमाक्षी प्रोटोजोआ | ④ स्पोरोजोआ |

अमीबिय प्रोटोजोआ :-

यह ऐसे प्रोटोजोआ होते हैं जो स्वच्छ जल में, समुद्री जल में तथा नम मृदा में पाये जाते हैं। यह कूटपादों की सहायता से गति करता है और उनकी सहायता से शिकार करते हैं जो पकड़ते हैं।

उदा. — एण्ट अमीबा हिस्टोरिऑटिका

कशाशिकीय प्रोटोजोआ :-

एसे प्रोटोजोआ जो परजीवी होते हैं इनके शरीर के ऊपर कशाशिकीय पाई जाती हैं,

इसीलिए इसे कक्षाक्रीय प्रोटोजोआ कहते हैं।

उदा. — ट्रेपेनोसोमा

{ Note : — ट्रेपेनोसोमा से निद्रा रोग होता है जो (Tse, Tse) सी. सी. मक्खन के काटने से होता है। }

* पक्ष्माक्षी प्रोटोजोआ : —

यह ऐसे प्रोटोजोआ होता है जो जल में पाये जाते हैं और उनके शरीर के ऊपर छोटे-छोटे तंतु (पक्ष्माक्षी) पाये जाते हैं जिन्हें द्वारा यह गति करते हैं।

उदा. — पैरामिथियम

* स्पोरोजोआ :

ऐसे प्रोटोजोआ जो परजीवी होते हैं, इनमें बीजाणु अवस्था पाई जाती है। सबसे सुप्रसिद्ध प्लाज्मोडियम (मलेरिया परजीवी) प्रजाति होती है, जिसके कारण मानव में मलेरिया रोग होता है। प्लाज्मोडियम चार प्रकार के होते हैं —

- ① प्लाज्मोडियम ओवेल्सी ② प्लाज्मोडियम वेइवेल्लस
- ③ प्लाज्मोडियम मलेरियाई ④ प्लाज्मोडियम फ़ैल्सीफ़ेरम

Note : —

मानव में मलेरिया रोग का रोग वाहक मादा एनाफिलिक्स मच्छर तथा रोग जनक प्लाज्मोडियम है।

Imp Points

- * प्रोटेस्टा शब्द स्वप्रथम अर्नेस्ट हेकेल नामक वैज्ञानिक ने दिया था,
- * प्रोटेस्टा जगत को वर्गीकरण का खड़ाबान कहते हैं,

* कवक - जगत *
 (Kingdom - fungi)
 *

कवक जगत के सभी जीव एककोशकीय बहुकोशकीय यूकेरियोटिक होते हैं। यह सभी जीव परजीवी तथा मृतोपजीवी होते हैं जो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। कवको का शरीर तंतुओं से मिलकर बना होता है जिसे कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु आपस में मिलकर एक जाल के समान संरचना को बनाते हैं जिसे कवक जाल (mycelium) कहते हैं।

कवको का अध्ययन कवक विज्ञान (Mycology) कहलाता है। कवक विज्ञान के जनक भारतीय कवक विज्ञान के जनक **De bary** तथा **E. J. Butler** हैं।

कवको के सामान्य लक्षण : —

- ① सभी कवक एककोशकीय तथा बहुकोशकीय यूकेरियोटिक होते हैं।
- ② कवको का शरीर तंतुवत होता है।

- ③ कवको में पटर हो सकते हैं और नहीं भी।
- ④ कवको में कोशिका भित्ति फ़र्गन सेल्युलोज के बनी होती है।
- ⑤ इनमें अर्सेगिक जनन एकाइन विरवाइन तथा मुकुलन के द्वारा होता है।
- ⑥ लैगिक जनन बिजाणुओं (स्पोर ~~स्पोर~~ Spores) के द्वारा होता है।
- ⑦ कवको में भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है।

Ques कवको को कितने वर्गों में बाँटा गया है ?

कवको को निम्न चार वर्गों में बाँटा गया है,

- ① फ़ाइको माइसिलिय
- ② ऐस्को माइसिलिय
- ③ बेसिडियो माइसिलिय
- ④ इमुटेरो माइसिलिय

- ① फ़ाइको माइसिलिय : फ़ाइको माइसिलिय सड़ी-गमि लकड़ी नम स्थानों तथा जलीय आवासों में पाये जाते हैं।
- ② इसका कवक जाल पटरविहिन होता है तथा बहुकेन्द्रकीय होता है।

- ③ इनमें अर्सेगिक जनन चयन बिजाणु अथवा अचयन बिजाणु के द्वारा होता है।

- ④ इनमें युग्मकों का आकार समयुग्मक विषम युग्मक अथवा असम युग्मक प्रकार का हो सकता है।
- ⑤ इनमें कवक जाल संयुक्त होकर एक गोलाकार संरचना को बनाती है, जिसे जाइगोस्पोर कहते हैं।

उदा. : — मूकुर, राइजोपस, ऐलबुगो

(2) ऐस्कोमाइसिटिज : —

- (1) इनका आकार शैली के समान होता है इसलिए इसे शैली फंजाई कहते हैं।
 - (2) ऐस्कोमाइसिटिज में एककोशकीय कवक जैसे - शीस्ट्रेकोरेमाइसिस रेरीवेसी और बहुकोशकीय कवक जैसे - पेनिसिलियम आते हैं।
 - (3) यह कवक परजीवी, मृतोपजीवी तथा अपघटक होते हैं।
 - (4) यह कवक शामिल रागी (पशु विष्टा) पर उगने वाले होते हैं।
 - (5) ऐस्कोमाइसिटिज में विभिन्न प्रकार के कवक पाये जाते हैं अर्थात् उनमें पट्ट पाये जाते हैं।
 - (6) उनमें लैंगिक प्रजनन ऐस्कोस्पोर्स के द्वारा होता है।
 - (7) उनमें अलैंगिक प्रजनन कोनिडिया के द्वारा होता है।
 - (8) उनमें कवक जाल एक शैली के समान संरचना को बनाती है जिसे ऐस्कोकार्प कहते हैं।
- उदा. : — ब्यूरोस्पोरा, क्लेविसेल्स, ऐस्पेर्जिलस।


Note : —

ऐस्कोकार्प तीन प्रकार की होती है, ऐस्कोमाइसिटिज में ऐस्कोकार्प संरचना देखने को मिलती है।

(1) क्लेविसेल्स थिसियस : —


ऐसी संरचना जिसमें ऐस्कोस्पोर्स

चौथी तरफ से गोलाकार संरचना के मध्य में पाये जाते हैं।
उदा. : — पेनिसिलियम, ऐस्पेर्मिलस



चित्र :- पिलस्टोमिसियम

② एपेथिसियम : — ऐसी संरचना जिसमें एस्कोस्पोर्स एक प्वाले के समान संरचना के ऊपर लगे होते हैं, उसे एपेथिसियम कहते हैं।
उदा. : — पेजाइजा



चित्र :- एपेथिसियम

③ पेरीथिसियम : — ऐसी एस्कोकार्प जिसमें एस्कोस्पोर्स एक फल्लोस्फ के समान संरचना के मध्य में पाया जाता है।
उदा. : — न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेल्स



(3) बेसिडियो माइसिलियम : — यह एक विकसित प्रकार के कवक होते हैं जो मिट्टी वृक्ष के छेदों तथा समीप पादपों के अन्दर परजीवी के रूप में उगते हैं।

लक्षण : —

- (1) इसमें गुम्बद के आकार की संरचना बनती है जिसे बेसिडियम कहते हैं, इसके अन्दर बेसिडियोस्पोर्स पाये जाते हैं।
- (2) इसमें लैंगिक जनन बेसिडियोस्पोर्स के द्वारा होता है।
- (3) इसमें लैंगिक अंग नहीं होते हैं,
- (4) इसमें अलैंगिक जनन एकांजन विधि के द्वारा होता है।
- (5) इसमें लैंगिक जनन की तीन प्रमुख क्रियाएँ होती हैं — (i) कोशिका द्रव्य का संयुग्मन (Plasmogamy)
(ii) केंद्रक का संयुग्मन (Karyogamy)
(iii) अर्धवृत्ती विभाजन (meiosis)

(6) बेसिडियो माइसिलियम में कवक जाल तीन प्रकार का होता है — (i) प्राथमिक (ii) द्वितीयक (iii) तृतीयक

उदा. : — ऐगोरीकस (मशरूम), पनिसनिया, आस्ट्रीलेगो

4) इयूटेरोमाहीसीटज :-

- 1) यह निम्न का फलक है।
 - 2) इसे अपूर्ण फलक भी कहा जाता है क्योंकि इसमें लैंगिक जनन नहीं होता है।
 - 3) इसमें अलैंगिक बीजाणुओं के द्वारा होता है जिसे कोनिडिया कहते हैं।
 - 4) इस फलक को एस्कौमाहीसीटज व वेसिडियोमाहीसीटज में रखा दिया जाएगा जब लैंगिक जनन की स्वेज हो जाएगी।
 - 5) इसका फलक जल से शीघ्रतः सूख जाता है।
 - 6) इसमें कुछ सदस्य मृतजीवि अथवा परजीवि होते हैं, लेकिन अधिकांश सदस्य अप्रसारित पदार्थों का अपघटन करते हैं।
- उदा. :- ट्राइकोडर्मा, आल्टरनेरिया, कोलीटोड्राइकम

~~7) फलकों के आर्थिक महत्व :-~~
 फलकों का निम्न आर्थिक महत्व :-

- 1) बेकरी उद्योगों में :- बेकरी उद्योग में यीस्ट का उपयोग ब्रेड, डबल बेरी, केक आदि बनाने में किया जाता है।
- 2) शराब उद्योग में :- शराब बनाने के लिए यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। शराब किण्वन की प्रक्रिया (fermentation) द्वारा बनाई जाती है।

③ पनीर बनाने में : — ~~सेक~~ ~~हरी~~ ~~उद्योगों~~ में ~~पनीर बनाने के लिए पेनिसिलियम ब्ल्यूफोर्टिस कवक का उपयोग किया जाता है~~

④ औषधि उद्योग में : — औषधि उद्योगों में अनेक प्रकार की औषधि बनाने में निम्न कवकों का उपयोग किया जाता है जैसे — (i) LSU परप्यूरिया कवक निमणि में ~~क्लेविसेल्स~~ ~~क्लेविसेल्स~~ का उपयोग किया जाता है (ii) साइक्लोस्पोरिन एक प्रतिरक्षा निरोधक औषधि है जिसका निमणि ट्राइकोडर्मा चॉलीस्पोरम कवक से किया जाता है। (iii) स्ट्रेप्टिन नामक औषधि का निमणि ऑनोस्कुस परप्यूरियस नामक कवक से किया जाता है, (iv) सेड - गले पदार्थों का अपघटन करने के लिए कवकों का उपयोग किया जाता है, (v) कुछ कवकों का उपयोग नाइट्रोजन का स्थरीकरण करने के लिए किया जाता है जैसे : — रोडोटुसला । (vi) कुछ कवकों का उपयोग वादप हार्मोन निमणि में किया जाता है जैसे : जिवरेलिन उत्पादन में जिवरेला फ्यूजी कुरोई कवक का उपयोग किया जाता है,

* Virology * विषाणु विज्ञान *

Ques विषाणु क्या है ? विषाणु के सजीव और निर्जीव के समान लक्षण लिखिए ?

Ans:- विषाणु :- विषाणु की उत्पत्ति वाइरस वाद से हुई है। जिसका शाब्दिक अर्थ पिण्डित विष होता है, अर्थात् विषाणु ऐसे सूक्ष्मकण होते हैं जो मग्न आँखों से दिखाई नहीं देते हैं यह जंतु और पक्षियों में रोग फैला करते हैं। विषाणु की खोज सर्वप्रथम डिमीत्री इवानोवोव्सकी ने 1892 में की थी। विषाणु का अध्ययन Virology में किया जाता है।

विषाणु सजीव और निर्जीव दोनों के समान लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। इसलिए इन्हें सजीव और निर्जीव के मध्य की संयोजक कड़ी कहते हैं।

विषाणु के सजीवों के समान लक्षण :-

- 1) विषाणु जीवित कोशिका में रोग फैला कर सकते हैं।
- 2) विषाणु जीवित कोशिका में अपनी संख्या को बढ़ा सकते हैं।
- 3) विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ DNA या RNA पाया जाता है।
- 4) विषाणु में नाभिकी अम्ल क्लोरोफिल की दमिती पाई जाती है।
- 5) विषाणु में संवेदनशीलता पाई जाती है।
- 6) विषाणु में उत्परिवर्तन होता है।
(mutation)

* निजीजी के समान विषाणु के लक्षण :-

- ① यह जीवित कोशिका के बाहर वृद्धि नहीं करते हैं,
- ② इनमें स्वयं अंग एवं स्वयं की क्रिया नहीं होती है,
- ③ विषाणु में ~~अव्यवस्था~~ ताप के प्रति प्रतिरोधकता होती है,
- ④ इनमें कोशिकाद्रव्य नहीं पाया जाता है।
- ⑤ विषाणु में अप्रचयी क्रिया नहीं पाई जाती है।

उदा. :- TmV, जीवाणु भोजी (Bacteriophage)।


* TmV विषाणु की संरचना को समझाइए ?

TmV [Tobacco mosaic virus]

✓ TmV :- एक पादप विषाणु है जिससे तम्बाकू के पौधे TmV में रोग उत्पन्न होता है।

TmV विषाणु की संरचना को देखने पर इसमें बाहर की ओर प्रोटीन का बना हुआ एक आवरण पाया जाता है जिसे कैप्सिड कहते हैं। प्रत्येक कैप्सिड उपइकाइयों से मिलकर बना होता है जिन्हें कैप्सोमियर कहते हैं। TmV विषाणु में एक कैप्सिड में 2130 कैप्सोमियर पाये जाते हैं और एक 2130 कैप्सोमियर में 158 अमीनो अम्ल पाये जाते हैं। TmV विषाणु के मध्य में कुछ एकल सूत्री

RNA को RNA पाया जाता है जो आनुवांशिक पदार्थ रूप में कार्य करता है।



चित्र :- TMV की संरचना

जीवाणु भोजी की संरचना को समझाइए

जीवाणु भोजी ऐसे विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं पर प्रक्रमण करते हैं, इसीलिए इन्हें जीवाणुभोजी कहते हैं। जीवाणु भोजी का आकार सेढ़क के रेडपोल के समान होता है। जीवाणु भोजी की खोज फ्रेंच वैज्ञानिक ने 1915 में की थी। इसकी संरचना को देखने पर निम्न भाग पाये जाते हैं। (i) सिर (ii) ग्रीवा (Neck) (iii) Tail (पूंछ) (iv) आधार प्लेट (Basal plate) (v) पूंछ तंतु (Tail fibre)

1) सिर : — जीवाणु भोजी का सिर घटकोणीय आकार का होता है या बहुभुजाकार होता है इसके चारों तरफ प्रोटीन का आवरण पाया जाता है और मध्य में DNA पाया जाता है।


2) ग्रीवा (Neck) : — सिर और पूँछ के मध्य में एक अंधि स्थल पाया जाता है जो एक चपटी लेट के समान होता है जो ग्रीवा कहलाती है।

3) पूँछ (Tail) : — ग्रीवा के नीचे पतले लम्बे भाग को पूँछ कहते हैं जो केवल प्रोटीन का बना होता है, इसमें नाभिक्य अम्ल नहीं पाया जाता है।

4) आधारीय लेट (Basal plate) : — पूँछ के नीचे घटकोणीय आकार की लेट के समान संरचना पाई जाती है जिसे आधारीय लेट कहते हैं।

5) पूँछ तंतु : — आधारीय लेट के प्रत्येक कोने से एक तंतु के समान संरचना निकलती है जिसे पूँछ तंतु कहते हैं।

आधारिय लैट के नीचे से खुरियों के समान नुकीली संरचना निकलती है जो जीवाणु को झटके में सहायक होते हैं।



चित्र :- जीवाणु कोषी की संरचना

वाइरॉइड क्या है ?

Ans

सन् 1931 में T.O. होब्स नामक वैज्ञानिक ने वाइरॉइड को खोजा जो पौधों के भी यह ऐसे सूक्ष्मकण होते हैं जो पौधों के भी होते हैं जिनमें केवल प्रोटीन होता है जो अन्न पाया जाता है प्रोटीन नहीं होता है जो जीवों में रोग पैदा कर सकता है।

पहला खोजा गया वाइरॉइड - पोटेटो स्पीडल
[Potato spindle tuber viroid]

Ques - प्रोओन क्या है ? [प्रोसंक]

Ans यह ऐसे सुक्ष्मकण होते हैं जिसमें केवल प्रोटीन पाया जाता है न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता है प्रोओन कहलाते हैं, जो जीवों में संक्रमण कर सकते हैं।

Imp Ques साइकेन क्या है ?
Ans कवक और शैवाल का ऐसा सहजीवी संबंध जो आपस में जीवित रहने के लिए एक-दूसरे पर निर्भर करते हैं और इस प्रकार से जुड़े होते हैं कि कवक शैवाल को जल तथा पोषक पदार्थ पहुँचाता है वही शैवाल प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाता है जो कवक को पहुँचाता है।

Important point

1. कवको के अध्ययन को MyCology कहते हैं।

2. कवक विज्ञान के जनक De Bary को कहा जाता है।

3. भारतीय कवक विज्ञान को E. J. Butler को कहा जाता है।

4. पेनिसिलियम नोट्टम नामक कवक से पेनिसिलिन प्रोटीन विक दवाई बनाई जाती है।

5. यीस्ट एक एककोशिकीय कवक है जिसका उपयोग एल्कोहल और ब्रेड उद्योग में किया जाता है।

- 6) येनिसिलियम या एस्कोमाइसिटिन की एक जमलरागी (पशु विषा) पर उगने वाले कवक है।
- 7) विषाणु की उत्पत्ति वाह्यम बरत से हुई है।
- 8) विषाणु की रोज डिमीत्री ~~हवा~~ इवाइनोव्सकी ने की थी।
- 9) अधिकांश पादप विषाणुओं में अनुवांशिक पदार्थ होता है, परन्तु कुछ विषाणुओं में अनुवांशिक पदार्थ भी होता है जैसे जीवाणु बीजाणु वाह्य DNA की रोज सन 1971 में T.O. डाइमर
- 10) Tmv का पूरा नाम Tobacco mosaic virus है।
- 11) HIV का पूरा नाम Human Immuno virus (AIDS रोग)
- 12) AIDS का पूरा नाम Acquired Immuno Deficiency Syndrome - है।
- 13) Tmv विषाणु में केमि कैरसोमियर की संख्या 2130 कैरसोमियर में 158 उमीने अम्ल होते हैं।
- 14) PSTVd = Potato spindle tuber viroid.
- 15) कवक और शैवाल के सहजीवि संबंध को लाइकेन कहते हैं।