


Chapter — 3

પાઠ્ય - જ્ઞાન



Ques पादप जगत क्या है ? इसको प्रमुख लक्षण लिखिए।

Ans पादप जगत के अन्तर्गत सभी प्रकार के पेड़-पौधों को रखा गया है। वर्तमान समय में लगभग 3500 पौधों की प्रजातियों की खोज हो चुकी है। पौधों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान कहलाता है। पौधों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टस है।

* पादप जगत के लक्षण :-

- ① इस जगत के सभी जीव बहुकोशकीय यूकेरियोटिक होते हैं और कुछ एककोशकीय भी होते हैं। जैसे - शैवाल
- ② पौधों में हवेलवक पाया जाता है जिससे वह प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अर्थात् यह स्वपोषी होते हैं।
- ③ कुछ पौधे परजीवी व मृतोपजीवी भी होते हैं। एवं कीटखशी भी होते हैं।
- ④ पादप जगत के सभी सदस्यों में लैंगिक अलैंगिक तथा क्रमिक प्रजनन पाया जाता है।
- ⑤ पादप जगत के सभी सदस्यों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है।
- ⑥ पादप जगत के जीवों में भोज्य पदार्थ स्टार्च के रूप में संग्रहीत होता है।
- ⑦ पादप जगत के सदस्य जल तथा भोज्य पदार्थ पर पामे जाते हैं।

* ब्रैलो फाइला :- यह एक अपुष्पीय पौधा होता है जिनका पादप शरीर बेलस (सूत्राय) के समान होता है। अर्थात् जिन पौधों का पादप शरीर जड़ किंवा तना और पत्ती में विभक्त नहीं किया जाता है और निम्न वर्ग के पौधे होते हैं उनमें संवहनीय बेल (जाइलम फ्लोएम) नहीं होता है।

जैसे :- ब्रैलोफाइला के अन्तर्गत कवक और शैवाल आते हैं।

Ques :- शैवाल क्या है? यह कितने प्रकार के होते हैं समझाइए?

शैवाल एक निम्न वर्ग के पौधे होते हैं, इनका पादप शरीर तंतुवत् बेलस के समान होता है यह लवणीय एवं अलवणीय दोनों प्रकार के जल में पाये जाते हैं। शैवाल के अध्ययन को Phycology कहते हैं। इसका जनक E. E. Smith (स्मिथ)

* उदा. :- उडोगोनियम, स्पाइरोगैयरा, कारा, क्लैवाक्स, वॉल्वाक्स, वाइचेरिया।

* बैंगल के लक्षण :-

- 1) यह ब-वर्षी होते हैं और क्लोरोफिल मुक्त होते हैं।
- 2) बैंगल में लैंगिक अलैंगिक और कासिक जनन पाया जाता है।
- 3) बैंगल लवणीय अलवणीय जल में पाया जाता है।
- 4) इनका पाद पदारी तंतुवत ग्रैस के समान होता है।
- 5) इनकी कोष्ठिका सिति' प्लेयुमोन की बनी होती है।
- 6) बैंगल निम्न तीन प्रकार के होते हैं -
 - (i) क्लोरोफाइट (हरे बैंगल)
 - (ii) फ्रियोफाइट (भूरे बैंगल)
 - (iii) रेडोफाइट (लाल बैंगल)

• क्लोरोफाइट :-

क्लोरोफाइट के सदस्यों में क्लोरोफिल A और B पाया जाता है। इसलिए इनका रंग हरा होता है। हरे बैंगल कहलाते हैं। इनमें अम्ल वणिक कैरोटिन और कैरोटिनॉइड पाये जाते हैं।

उदा. = स्पाइरो गायरा, क्लेमाडोमोनास
वॉल्वाक्स, क्लोरोप्रिक्स

- * हरे डोंवाल के लक्षण :-
- 1) यह पचछ जल में पाये जाते हैं।
 - 2) यह एक कोश कीय हैं।
 - 3) यह हरे रंग के होते हैं।
 - 4) इनमें क्लोरोप्लास्ट डिस्क की तरह लेट जैसा सास जाति का रूप के समान सर्पिलाकार अथवा विषम के समान हो सकता है।
 - 5) इनमें भोज्य पदार्थ स्टार्च के रूप में संग्रहीत होता है।
 - 6) हरे डोंवाल की कोशिका भित्ति कठोर होती जिसकी भित्ति परत पेल्युलोज की बनी होती है तथा बाहरी परत पेक्टोज की बनी होती है।
 - 7) इनमें अलैंगिक जनन चल बीजाणुओं के द्वारा होता है।
 - 8) लैंगिक जनन समयुग्मकी अथवा विषमयुग्मकी प्रकार का होता है।

क्रियो फाइरी :-

इसमें क्लोरोफिल A एवं पाया जाता है और अन्तर्गत कैरोटीनोइड एवं जैन्थोफिल पाया जाता है। इसलिए इनका रंग भूरा होता है।

उदा. :- एकटोकार्पस डिक्ल्योरा लैमिनेरिया सरगारम प्रयुक्त।

लक्षण :-

- 1) इनमें क्लोरोफिल A और C पाया जाता है जिसके कारण ये भूरे रंग के होते हैं।
- 2) यह मुख्यतः बहुकोशिकीय होते हैं।
- 3) इनका आवास समुद्र होता है।
- 4) इनमें भोज्य पदार्थ लेमिलेरीन अथवा मैनीटोल के रूप में संग्रहीत होता है।
- 5) इनमें चल कोशिकाएँ पाई जाती हैं।
- 6) इनमें लैंगिक जनन समसुग्मकी और असमसुग्मकी एवं विषमसुग्मकी प्रकार का होता है।
- 7) इनमें कृत्रिम जनन विरवण्डन विधि के द्वारा होता है।

बोटोक्राहसी :-

इसमें क्लोरोफिल A और B पाया जाता है और अन्य वर्णक व R-क्राहको एरिथ्रिन होता है इसलिए इसका रंग लाल होता है।
उदा. :- पोलीव्साइजोनिया पोरफायरा, क्लोसिलेरिया जिलेडियम

लक्षण :-

- 1) लाल आवास मुख्यतः समुद्र में पाये जाते हैं उनके कारण समुद्र का जल लाल दिखाने देता है।
- 2) इनका पादप शरीर बहुकोशिकीय तंतुवत् होता है।

- 3) उनमें क्लोरोफिल और वाया जाता है, और अन्य वेक R - काइकोहरिथिन पाया जाता है।
- 4) उनमें भोज्य पदार्थ फ्लोरोइडिन के रूप में संचित होता है।
- 5) उनकी कोशिका सिति प्लेयुलोम की कनी होती है।
- 6) उनमें लैंगिक अलैंगिक तथा जामिक विधियों द्वारा जनन होता है।
- 7) इनके जीवन चक्र में चमकोशिकाएँ नहीं पाई जाती हैं।

* ब्रायोफाइट :-

स्थानों पर पाये जाते हैं और छायादार स्थानों पर पाये जाते हैं। उन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। इनका पादप कार्पर पत्ती के समान होता है। अर्थात् इसमें मूल रोम का और पत्ती पाई जाती है। ब्रायोफाइट को दो भागों में बाँटा गया है - (i) लिवरवर्ट (ii) मोस

ब्रायोफाइट के अध्ययन को ब्रायोलॉजी (Bryology) कहते हैं।

लक्षण :-

- 1) यह नम और धायादार प्थानो पर पाये जाते हैं,
- 2) इनका पादप शरीर पत्तियों के समान होता है जो मूलरोम तथा और पत्ती में बँटा होता है,
- 3) इनके पादप जगत का उभयचर कहा जाता है,
- 4) इनमें निषेचन के लिए जल का होना बहुत आवश्यक होता है।
- 5) यह असंवर्हिनीय असम्बहिनिय होते हैं।
अर्थात् जाइलम - फ्लोएम नहीं पाये जाते हैं।
- 6) इसमें नर जनन अंग को पुंधानी (एन्ड्रोडियम) और मादा जनन अंग को स्त्रीधानी (आर्किगोनियम) कहते हैं।

उदा. :- मार्केन्शिया, रिक्सिया, फ्यूजेरिया

* टेरिडो फाइटा :-

टेरिडो फाइटा प्रथम सम्बहिनिय पाँचे हैं अर्थात् इसमें पहली बार जाइलम फ्लोएम का विकास हुआ। परन्तु जाइलम में जाइलम वाहिका और फ्लोएम में सब सरवी कोशिका नहीं पाई जाती हैं।

उदा. — सिलेजिनेला डक्वी सिम, फुर्न, सैलबिनिया

लक्षण :-

- 1) टेस्टोफाइट का सजावट में बहुत अधिक आर्थिक महत्व है।
 - 2) टेस्टोफाइट ठोसे, गिले तथा धामादार स्थानों पर पाये जाते हैं। परन्तु कुछ बेतीले मिट्टी पर भी पाये जाते हैं।
 - 3) इनका पादप शरीर जड़, तना, पत्ती में बँटा होता है।
 - 4) इसमें बीजाणु का निमग्न होता है।
 - 5) इसमें नर जनन अंग ~~को~~ पुंधानी और मादा जनन अंग ~~को~~ स्त्रीधानी पाये जाते हैं।
 - 6) इसमें जनन अंग शुरु के समान होते हैं।
- ~~7)~~ टेस्टोफाइट को चार वर्ग में बाँटा गया है —

- | | |
|-------------------|-----------------|
| (i) साइलोपसिडा | (ii) लाइकोपसिडा |
| (iii) स्फीनोपसिडा | (iv) एगोपसिडा |

* अनावृतबीजीय पौधे (जिम्नोस्पर्म) जगन बीजी :-

ऐसे पौधे जिनमें बीज का आकार छोटा है तथा बीज आवरण नहीं पाया जाता है उन्हें जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी पौधे कहते हैं।

- * लक्षण :-
- ① इस समूह के सभी पौधे बहुवर्षीय होते हैं।
 - ② अण्डाशय पूर्ण विकसित नहीं होता है।
 - ③ इनमें बीज का आकार छोटा होता है तथा बीज आवरण नहीं पाया जाता है।
 - ④ इनमें द्विनिषेचन की क्रिया नहीं होती है।
 - ⑤ इनमें जलम - प्रसोषण पाये जाते हैं।
 - ⑥ इनमें द्वितीयक रुद्ध पाई जाती है।
- उदा. :- साइकस, पाइनस, गिंकगो

* आहत बीजी पौधे (एंगियोस्पर्म) :- ऐसे पुष्पीय पौधे जिनमें बीज का आकार बड़ा तथा बीज के चारों तरफ बीज आवरण पाया जाता है। इनमें अण्डाशय पूर्ण विकसित होता है।

- * सामान्य लक्षण :-
- ① ये बहुवर्षीय होते हैं।
 - इनका पादप शरीर जड़, तना, पत्ती में बँटा होता है।
 - ② इनमें अण्डाशय पूर्ण विकसित होता है।
 - ③ इनमें द्विनिषेचन होता है।
 - ④ इनमें द्वितीयक रुद्ध पाई जाती है।
 - ⑤ इनमें बीज का आकार बड़ा तथा बीज आवरण पाया जाता है।

6) इसमें कुछ पोष त्रिगुणित होता है,

उदा. : — आम, जामुन, पीयूष, वरुणाद

Que एकबीजपत्री पौधे तथा द्विबीजपत्री पौधों में अन्तर : —

एकबीजपत्री पौधे

द्विबीजपत्री पौधे

- | | | |
|----|--|--|
| 1) | इसे पौधे जिन्में एक बीजपत्र पाया जाता है उन्हें एकबीजपत्री पौधे कहते हैं। जैसे : — गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि। | इसे पौधे जिन्में दो बीजपत्र पाये जाते हैं उन्हें द्विबीजपत्री पौधे कहते हैं। जैसे : — सोयाबीन, चना, मटर, मसूर आदि। |
| 2) | इनमें अपर्याप्तिक जड़ें पाई जाती हैं। | इनमें मुख्य जड़ें पाई जाती हैं। |
| 3) | इनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है। | इनमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। |
| 4) | उनकी पत्तियों में समान्तर शिरा विन्यास पाया जाता है। | इसमें जात्रिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है। |
| 5) | इनमें स्पष्ट नियत ऊतक वंडल बिखरे होते हैं। | इसमें संवहन वंडल व्यवस्थित होते हैं। |

Temp Point :-

- 1) बौवाल के अध्ययन को Physiology कहते हैं।
- 2) बाल बौवाल (बोडो फ्राइसी) में अन्य वर्क R- फ्राइकोएरिथ्रिन पाया जाता है।
- 3) ब्रायोफ्राइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है।
- 4) टेरीडोफ्राइटा को पादप जगत का स्नोप कहा जाता है।
- 5) टेरीडोफ्राइटा प्रथम सर्वहनीय पादप होते हैं।
- 6) सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा पुल्फिया है।
- 7) सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा यूकेलिप्टस है।
- 8) बेधम तथा हुकर ने प्रकृतिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था।
- 9) ब्रायोफ्राइटा में निषेचन के लिए जल का होना आवश्यक है।
- 10) सूरे बौवाल को खुमुद्री स्वरूपवाए कहते हैं।
- 11) सबसे ऊँचा जिम्नोस्पर्म पौधा सिकोआ का पौधा होता है।
- 12) आवृतबीजी पौधों में भ्रूण पोष त्रिगुणित होता है।