

## प्राणी पादपों की शारीरिकी

Q. पादप अतक क्या है? यह कितने प्रकार के होते हैं?

पादप अतक ~~तक~~ (Plant Tissue) :- पादपों का

शरीर जिन कोशिकाओं के समूह से मिलकर बना होता है जो क्रियात्मक त संचनात्मक रूप से समान होती है उन्हें पादप अतक कहते हैं।  
पादप अतक निम्न प्रकार के होते हैं।

1) विभज्योतक :- ऐसे अतक जो लगातार विभाजित होते रहते हैं विभज्योतक कहलाते हैं। यह अतक जड़ तथा तने के शीर्ष भागों पर पाये जाते हैं।  
विभज्योतक तीन प्रकार के होते हैं -  
i) शीर्षस्थ विभज्योतक ii) अंतर विह iii) पार्श्व विभज्योतक

2) स्थायी अतक :- ऐसे अतक जिनकी कोशिकाएं स्थाई या अस्थायी रूप से विभाजन की क्षमता खो चुकी होती हैं ऐसे अतकों को स्थाई अतक कहते हैं। यह निम्न प्रकार के होते हैं -

i) स्थायी स्थायी अतक :- ऐसे स्थायी अतक जो एक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें स्थायी स्थायी अतक कहते हैं।

यह तीन प्रकार के होते हैं —

- i) मृदु अतक [ Mesenchyma ]
- ii) रेशूलीकोण [ Collenchyma ]
- iii) दृढ़ अतक [ Sclerenchyma ]

ii) जलिल स्थायी अतक :

ऐसे स्थायी अतक निम्न में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएँ पाई जाती हैं जो आपस में मिलकर एक ठोस के रूप में कार्य करती हैं जलिल स्थायी अतक कहलाते हैं।

यह दो प्रकार के होते हैं —

(i) जाइलम (दाख) :

ऐसे जलिल स्थायी अतक जो जड़ तथा तने के मध्य भाग में पाये जाते हैं जो जल तथा खनिज लवणों का परिवहन करने का कार्य करता है। जाइलम निम्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है —

- i) वाहिनी
- ii) वाहिकाएँ
- iii) जाइलम पैरेन्काइमा
- iv) जाइलम तन्तु

(ii) फ्लोएम (पोषवहा) :

ऐसे जलिल स्थायी अतक जो जड़ तथा तने के बाहरी भागों में पाये जाते हैं इनका प्रमुख कार्य पत्तियों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाने का होता है। यह निम्न कोशिकाओं से मिलकर बना होता है —

- i) चाल्सी जलिका
- ii) रेखी कोशिका
- iii) फ्लोएम पैरेन्काइमा
- iv) फ्लोएम तन्तु

iii) विविध अंतक : — ऐसे अंतक जो विविध प्रकार के कार्य करते हैं जिनकी उत्पत्ति में भिन्नता पाई जाती है विविध प्रकार के अंतक कहलाते हैं, यह अंतक गोंद, रंजिन और लैक्स का संश्लेषण करते हैं।

**Note :** — ① अंतक के अध्ययन को Histology कहते हैं।

② Father of Plant Anatomy "ग्राह्व" को कहते हैं।

③ शीर्षस्थ कोशिका सिद्धान्त "नागेली और हॉकमिस्टर" ने दिया है।

④ द्विलोमन सिद्धान्त हंस्लीन ने दिया था।

⑤ त्र्युनिका कार्पस सिद्धान्त शिमर ने दिया था।


⑥ जाइलम तथा फ्लोएम शब्द को नागेली ने दिया।

⑦ चालनी जालिका को "Hesling" ने खोजा था।

Q. रन्ध्र क्या है इसकी संरचना को समझाइए।

जड़ पत्रियों की उपरी तथा निचली सतह तथा पर  
अनेक छोटे-छोटे छिद्र पाये जाते हैं जिन्हें  
स्टोमेटा या रन्ध्र कहते हैं जो पौधों में  
व्यसन की क्रिया में भाग लेते हैं रन्ध्र की  
संरचना को देखने पर रन्ध्र में दो सम  
के बीच (कीडनी) के आकार की दो कोशिकाएँ  
पाई जाती हैं जिन्हें के फुवर कोशिका या  
द्रावर कोशिका कहते हैं। इनकी बाहरी सतह  
माही व उत्तल होती है और आन्तरिक सतह

पतली व आवतल होती है। द्वार कोशिका में बहुत अधिक संख्या में क्लोरोप्लास्ट पाये जाते हैं और यह कोशिकाएं रन्ध्र के खुलने एवं बन्द होने की क्रिया का नियंत्रण करती हैं। द्वार कोशिका के बाहर पाई जाने वाली कोशिका को सहायक या रक्षक कोशिका कहते हैं। धारण जूल के पोंछों में द्वार कोशिकाएं डबल के आकार की होती हैं।



चित्र :- रन्ध्र की संरचना (खुला हुआ)

Ques वाष्पी नालिका और वाहिका में अन्तर लिखिए -

## चापनी नालिका

## वाहिनिका

- |                                                        |                                                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ① चापनी नालिका फ्लोएम में पाई जाती है।                 | यह जाइलम में पाई जाती है।                       |
| ② यह कोज्य पदार्थों के परिवहन में सहायक होती है।       | यह जल के परिवहन में सहायक होती है।              |
| ③ इसमें अनेक छोटे-छोटे छिद्र होते हैं।                 | इसमें छिद्र नहीं पाये जाते हैं।                 |
| ④ इसकी कोशिका भित्ति में लिग्निन का जमाव नहीं होता है। | इसकी कोशिका भित्ति में लिग्निन का जमाव होता है। |

एकबीजपत्री जड़ तथा द्विबीजपत्री जड़ की आन्तरिक संरचना में अंतर —

## एकबीजपत्री जड़

## द्विबीजपत्री जड़

- |                                                         |                                              |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ① इसमें द्वितीयक कृच्छ्र नहीं पाई जाती है।              | इसमें द्वितीयक कृच्छ्र पाई जाती है।          |
| ② इसमें पितृ या मातृ पुर्ण विकसित होता है।              | इसमें उत्पन्न विकसित होता है।                |
| ③ इसमें कैम्बियम का निमणि नहीं होता है।                 | इसमें कैम्बियम का निमणि होता है।             |
| ④ इसमें सपंहनू वडलों की संख्या हमेशा 6 से अधिक होती है। | इसमें सपंहनू वडलों की संख्या 2-6 तक होती है। |

### एकबीजपत्री तना

① इसमें संपेहन लंडल बिखरे हुये होते हैं।

② इसकी बाह्य त्वचा पर रोम नहीं पाये जाते हैं।

③ इसमें पिथ ब्या मज्जा किरने पाई जाती हैं।

④ इसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है।

### द्विबीजपत्री तना

इसमें संपेहन लंडल व्यवस्थित होते हैं।

इसकी बाह्य त्वचा पर रोम पाये जाते हैं।

इसमें पिथ या मज्जा किरने नहीं पाई जाती हैं।

इसमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है।

### एकबीजपत्री पत्ती

i) इसमें ऊपरी तथा निचली सतह पर रन्ध्र समान संख्या में पाये जाते हैं।  
इसलिए इसे समद्विपार्श्व पत्ती कहते हैं।

ii) इसकी बाह्य त्वचा पर विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसे बुलीफार्म कोशिका bulliform cell कहते हैं।

iii) इसकी आन्तरिक संरचना में कोशिकाओं के मध्य में अन्तर्कोशिकीय अवकाश कम होता है।

### द्विबीजपत्री पत्ती

इसमें ऊपरी तथा निचली सतह पर रन्ध्र अलग-अलग संख्या में पाये जाते हैं।  
इसलिए इसे पृष्ठाधारी पत्ती कहते हैं।

इसमें बुलीफार्म कोशिका नहीं पाई जाती है।

इसकी आन्तरिक संरचनाओं में कोशिकाओं के मध्य में अन्तर्कोशिकीय अवकाश ज्यादा है।

i) इसमें स्पोन्जी पैरेनकाइमा पाया जाता है।

इसमें स्पोन्जी पैरेनकाइमा तथा पैलिसेड पैरेनकाइमा पाया जाता है।

0. आतक तंत्र क्या है यह किन प्रकार का होता है?

Ans. आतक तंत्र :-

उच्च वर्ग के पौधों में कुछ विशिष्ट कार्य करने के लिए एक इकाई के रूप में कार्य करने लगा जाते हैं जिसे आतक तंत्र कहते हैं। आतक तंत्र निम्न प्रकार के होते हैं -

1) बाह्य त्वचीय आतक तंत्र :-

इस आतक तंत्र को त्वचीय आतक तंत्र भी कहते हैं यह पौधों में बाह्य त्वचा का निमति करता है। इसके अन्तर्ग अर्धचर्म [Epidermis], रन्ध्र, त्वचीय रोम [Trichome] आते हैं।

2) भरण आतक तंत्र :-


बाह्य त्वचा और संतहन तंतु के बीच में पाये जाने वाले आतक को भरण आतक कहते हैं, इसके अन्तर्गत चक्रेट [Cortex], अधः त्वचा [Hypodermis], अन्तः त्वचा [Endodermis] मज्जा / पिथ विरण, मिजोफिल आते हैं।

3) संवहन अतक तंत्र :- अन्तः तन्त्रा के अन्दर जाइलम तथा फ्लोएम से बना हुआ एक जटिल अतक तंत्र पाया जाता है उसे संवहन अतक तंत्र कहते हैं। जब द्विवीजपत्री पौधों में जाइलम तथा फ्लोएम के मध्य के मिश्रण (एधा) पाया जाता है तो इसे स्पुला संवहन बंडल कहते हैं। जब एकवीजपत्री पौधों में जाइलम तथा फ्लोएम के मध्य के मिश्रण नहीं पाया जाता है तो इसे बन्द प्रकार का संवहन बंडल कहते हैं।

संवहन बंडल निम्न प्रकार के होते हैं -

i) अरीय संवहन बंडल      ii) असंयुक्त      iii) शैकेन्द्रीय संवहन बंडल

i) अरीय संवहन बंडल :- ऐसा संवहन बंडल जिसमें जाइलम और फ्लोएम अलग-अलग त्रिज्या पर पाये जाते हैं तो इसे अरीय संवहन बंडल कहते हैं।



गन्धक - 2 ग्राम, लवंग - 2 ग्राम

लवंग - 2 ग्राम, लवंग - 2 ग्राम


लवंग - 2 ग्राम, लवंग - 2 ग्राम

2) संयुक्त सपंहन बंडल :-


ऐसा सपंहन बंडल जिसमें जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर पाये जाते हैं + यह दो प्रकार के होते हैं — i) कोलेटरल सपंहन बंडल ii) वाई कोलेटरल सपंहन बंडल

i) कोलेटरल :-

इस प्रकार के सपंहन बंडल में जाइलम केन्द्र की तरफ तथा फ्लोएम बाहर की ओर होता है तो इसे कोलेटरल सपंहन बंडल कहते हैं, जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में या मध्य में कैम्बियम उपस्थित होता है तो इसे कोलेटरल खुला हुआ सपंहन बंडल कहते हैं और जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम अनुपस्थित होता है तो इसे कोलेटरल बंद प्रकार का सपंहन बंडल कहते हैं,



(A)




(B)

चित्र :- कोलेटरल खुला हुआ का सपंहन बंडल


ii) वाई कैलेरल संवहन :-

यदि किसी वंश में जाइलम तथा फ्लोएम दोनों तरफ पाया जाता है तो इसे वाई कैलेरल संवहन कहते हैं।




3) सेंक्रेटरीय संवहन वंश :-

इस प्रकार के संवहन वंश में जाइलम या फ्लोएम में से कोई एक केन्द्र में स्थित होता है तो इसे सेंक्रेटरीय संवहन वंश कहते हैं। जब जाइलम केन्द्र में और फ्लोएम चारों तरफ पाया जाता है तो इसे एम्फिक्राइबल संवहन वंश कहते हैं और जब फ्लोएम केन्द्र और जाइलम चारों तरफ होता है तो इसे एम्फिवेसल संवहन वंश कहते हैं।



एम्फिक्राइबल



एम्फिवेसल

## Lomop Point

- 1) ऐसे जलीय पौधे जिनके पेरिन्काइमा अंतर्को में वायु भरी होती है उसे "एरेनकाइमा" कहते हैं।  
और जब पेरिन्काइमा अंतर्को लम्बी कोशिकाओं से बने होते हैं तब उन्हें "प्रोएरेनकाइमा" कहते हैं।
- 2) एकबीजपत्री जड़ में अरीय संवहन बंडल पाये जाते हैं।
- 3) एकबीजपत्री तनों में एक प्रकार के संवहन बंडल पाये जाते हैं।
- 4) द्विबीजपत्री पौधों में द्वितीयक वृद्धि के कारण पौधों की मोटाई में वृद्धि होती है।
- 5) पत्तियों के गिरने की क्रिया को पर्णविलगन कहते हैं।
- 6) कुछ पादपों की बाहिकाओं में कुछ राखने के समान संरचना बन जाती है जिसे टायलॉरिक्स कहते हैं।
- 7) कार्क कैम्बियम को फ्लोमन कहते हैं।
- 8) जब पेरिन्काइमा अंतर्को में क्लोरोप्लास्ट का विकास हो जाता है तब उन्हें क्लोरेनकाइमा कहते हैं।
- 9) फ्लोएम को Bast या Leptome भी कहते हैं।
- 10) पार्श्व जड़ों की उत्पत्ति पैरीसाइकल होती है।
- 11) वृक्षों की आयु का निर्धारण वार्षिक वलय को गिनकर किया जाता है। और डब्लूका अध्ययन करना "Dendrochromology" कहलाता है।