

Chapter : - 8

कोशिका जीवन की इकाई

Ques. कोशिका क्या है
 Ans. कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है। कोशिका शब्द की उत्पत्ति Cell शब्द से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ छोटे-छोटे कमरे होता है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूक नामक वैज्ञानिक ने 1665 में कोशिका का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे (कोशिका विज्ञान) कहते हैं। Cytology

Note : - जीवित कोशिका की खोज हॉक ने 1674 में की थी, ~~Antoni van Leeuwenhoek~~ एंटीनी वॉन ल्यूवेन

Ques. पादप कोशिका और जन्तु कोशिका में अन्तर-

पादप कोशिका	जन्तु कोशिका
i) पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है।	जन्तु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसमें केवल कोशिका झिल्ली होती है।
ii) इसमें हरितलवक पाया जाता है।	इसमें हरितलवक नहीं पाया जाता है।

इसमें लाइसोसोम और सेन्ट्रोसोम नहीं पाया जाता है।	इसमें लाइसोसोम और सेन्ट्रोसोम पाये जाते हैं।
पादप कोशिका में रिक्ति का आकार बड़ा होता है।	इसमें रिक्ति का आकार छोटा होता है।
इसमें स्वयं प्रजनन पाये जाते हैं।	इसमें प्रजनन नहीं पाया जाता है।

कोशिका सिद्धान्त क्या है? समझाइए।

प्र. कोशिका सिद्धान्त (Cell Theory) :-

जर्मनी के एक वैज्ञानिक "रूडोल्फ वीर" सन् 1838 में वनस्पति वैज्ञानिक थे, उन्होंने पादप कोशिकाओं पर अध्ययन किया तथा सन् 1839 में ब्रिटिश के एक वैज्ञानिक "थॉमस श्वान" ने जन्तु कोशिकाओं पर अध्ययन किया। इन दोनों वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से बताया कि सभी कोशिकाएँ परस्परान्तरिक और क्रियात्मक रूप से एक समान होती हैं। परन्तु पादप कोशिका में कोशिका भित्ति (Cell wall) तथा जन्तु कोशिका में कोशिका झिल्ली (Cell membrane) पाई जाती है, इन दोनों वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धान्त प्रतिपादित किया।

सन् 1855 में रूडोल्फ विर्रो ने एक कथन दिया "Omnia cellula e- cellula" जिसका अर्थ है प्रत्येक

नई कोशिका कि उत्पत्ति अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से होती है, उत्पत्ति अपनी पूर्ववर्ती कोशिका

इस सिद्धान्त के महत्वपूर्ण बिन्दु =

- ① सभी जीव कोशिका तथा कोशिका उत्पाद से बने होते हैं।
- ② सभी कोशिकाएँ पूर्व विद्यता कोशिका से निर्मित होती हैं।

Ques. प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में अन्तर लिखिए ?

प्रोकैरियोटिक कोशिका

यूकेरियोटिक कोशिका

① ऐसी कोशिका जिसमें केन्द्रक के चारों तरफ केन्द्रकीय झिल्ली नहीं पाई जाती है अर्थात् अल्पविकसित केन्द्रक होता है।

ऐसी कोशिका जिसमें केन्द्रक के चारों तरफ केन्द्रकीय झिल्ली पाई जाती है अर्थात् विकसित प्रकार का केन्द्रक पाया जाता है।

② इसमें कोई भी विकसित कोशिका अंग नहीं पाये जाते हैं जैसे - माइटोकण्ड्रिया, हरितलवक, ग्लोजीकाय आदि।

इसमें सभी विकसित कोशिका अंग पाये जाते हैं।

③ इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है।

इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है।

④ इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है।

इसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है।

मनुष्य कोशिका और पादप कोशिका का नामांकन

चित्र

लेबल

लाइसोसोम

कोशिका झिल्ली

केन्द्रिका

अन्तः प्रद्रव्य जालिका
[E.R.]

गॉल्जीकाय

माइटोकॉन्ड्रिया

हरितलवक

रिक्तिका

राइबोसोम

प्लाज्मा डेमेला

परऑक्सीसोम

चिक्की अन्तः प्रद्रव्य जालिका

कोशिका झिल्ली

गॉल्जीकाय

लाइसोसोम


राइबोसोम

माइटोकॉन्ड्रिया

केन्द्रक

कोशिका द्रव

अन्तः प्रद्रव्य जालिका



Ques. कोशिका भित्ति क्या है? इसके कार्य लिखिए।

कम पादप कोशिका में सबसे बाहर की मोर
सेल्यूलोज का बना हुआ एक आवरण
पाया जाता है जिसे कोशिका भित्ति कहते
हैं यह उपजीवित होती है शैवालों की
कोशिका भित्ति सेल्यूलोज गैलेक्टोस
व कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है
जबकि दूसरे पौधों की कोशिका भित्ति
सेल्यूलोज हेमीसेल्यूलोज व पेक्टिन की बनी होती है।

कोशिका भित्ति के तीन स्तर होते हैं - ① प्राथमिक
कोशिका भित्ति ② द्वितीयक कोशिका भित्ति
③ मध्य परतिका

कोशिका भित्ति के कार्य :-

(i) यह कोशिका को
निश्चित आकार प्रदान करती है।

(ii) यह कोशिका की सुरक्षा करती है।

(iii) यह कोशिका को यांत्रिक सहाय प्रदान
करती है।

Ques. कोशिका झिल्ली क्या है? इसके कार्य लिखिए।
Ans. कोशिका झिल्ली :-

कोशिका भित्ति के
ऊपर तथा कोशिका द्रव के बाहर एक
के समान संवचना पाई जाती है
कोशिका झिल्ली कहते हैं।

सन् 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हो जाने के बाद कृषि शिक्षा जिल्लों की संरचना को आसानी से समझा गया।

कृषि शिक्षा जिल्लों के अन्य नाम : — प्लाजा जिल्ला, प्लाज्मा लैमा, डिकर कला

कृषि शिक्षा जिल्ला के कार्य : —

- (i) कृषि शिक्षा जिल्ला कृषि शिक्षा द्रव्य को घरे पूरने का कार्य करती है।
- (ii) यह पोषक पदार्थों के परिवहन में सहायक होती है।
- (iii) यह परासरण का कार्य करती है।


कृषि शिक्षा जिल्ला की संरचना को समझाने वाला तरल मोजेक मॉडल को समझाइए।

सन् 1972 में सिंगर और निकोलसन ने कृषि शिक्षा जिल्ला की संरचना का तरल मोजेक मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल के अनुसार कृषि शिक्षा जिल्ला में फार-फोमिपिड के दो स्तर पाये जाते हैं और इसके बीच में दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं।

- (i) आन्तरिक प्रोटीन : — ऐसा प्रोटीन जो लिपिड की दोनो तहों में घुसा होता है जो दोनों तरफ बिखरि होता है। इसी आन्तरिक प्रोटीन कहलाता है।

ii) परिसीय प्रोटीन :-


लिपिड की बाहरी सतह पर पाये जाने वाले प्रोटीन को परिसीय प्रोटीन कहते हैं।



(सूत्र कठिना) * माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना को समझाइए ?


= माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति तश्तरीनुमा बेलनाकार होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की लम्बाई 1.0 - 4.1 माइक्रोमीटर तथा व्यास 0.5 माइक्रोमीटर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना है। बाहरी वाली झिल्ली को आन्तरिक झिल्ली कहते हैं जो अन्तर वाली झिल्ली के मध्य में अवकुशिका होती है। झिल्ली के अन्दर आधात्री (मैट्रिक्स) पाई जाती है, उसमें अंगुली के समान अन्तर पलन संरचना (संरचना) पाई जाती है जिसे क्रिस्ती कहते हैं। क्रिस्ती के ऊपर अंगुर पाये जाते हैं जिन्हें इपसन कहा जाता है। ऊपर कहे हैं अन्ही पर ATP के रूप में ऊर्जा संचित होती है इसकी खोज रॉबर्ट वीगस नामक वैज्ञानिक ने की थी।

कोशिका में ऊर्जा का संग्रहण माइटोकॉन्ड्रिया में ATP के रूप में होता है जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह या कहते हैं। (शक्ति गृह) माइटोकॉन्ड्रिया की आधारी में एकल वृत्ताकार DNA व कुछ RNA एवं 70S राइबोसोम, प्रोटीन पाये जाते हैं।



माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य :- (1) माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख कार्य कोशिका में ऊर्जा का संग्रहण एवं संग्रहण का हुआ होता है। (2) माइटोकॉन्ड्रिया वायवीय श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

हरितलवक [क्लोरोप्लास्ट] क्या है ? हरितलवक पत्तियों के मीजोफिल कोशिकाओं में मुख्यतः पाया जाता है जहाँ के कारण पत्तियों का रंग ग्रीन कलर का होता है।



हरितलवक की माइटोकॉन्ड्रिया के समान दोहरी झिल्ली होती है, इसकी लम्बाई $5-10 \mu m$ तथा चौड़ाई $2-4$ माइक्रोमीटर तक होती है। क्लोरोप्लास्ट की खोज "सेच" नामक वैज्ञानिक ने की थी तथा क्लोरोप्लास्ट शब्द "सिम्पर" ने दिया था। हरितलवक में सबसे बाहर की ओर बाहरी झिल्ली अंदर की ओर आन्तरिक झिल्ली पाई जाती है। आन्तरिक झिल्ली के अंदर स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा में भूतंकार अभिक्रिया सम्पन्न होती है। स्ट्रोमा में किताबों के पन्नों के समान एक के ऊपर एक व्यवस्थित शैली के समान संरचना पाई जाती है जिसे ग्राइलेकोइड कहते हैं। इसकी एक इकाई को श्रोना कहते हैं।

और ग्रेना में प्रकाशित अभिक्रिया सम्पन्न होती है। स्ट्रोमा में ही विद्युतीय DNA व 70s राइबोसोम पाये जाते हैं।

हरितलवक के कार्य :-

- (1) हरितलवक का सबसे प्रमुख कार्य प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन निर्माण का होता है।
- (2) हरितलवक में क्लोरोफिल पाये जाते हैं जिसके कारण पत्तियाँ रंगीन होती हैं।

Note :- क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोइया भी कहा जाता है।

* राइबोसोम क्या है व यह कितने प्रकार का होता है -

राइबोसोम में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। राइबोसोम की खोज जार्ज पेन्ड ने 1953 में की थी। राइबोसोम एक सनेदार संरचना होती है जो केन्द्रीय झिल्ली व अन्तः प्रद्रव्य जालिका (ER) के ऊपर पाये जाते हैं।

राइबोसोम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं -


(i) 70s राइबोसोम :- यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाये जाते हैं, इसकी दो उपइकाईयाँ होती हैं 50s तथा 30s जहाँ पर 8 का अर्थ स्टेरकाई होता है।

(ii) 80s राइबोसोम : यह यूकेरियोटिक कोशिका में पाये जाते हैं जिनकी दो उपइकाइया होती है 60s तथा 40s ।

कार्य : प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य कार्य राइबोसोम का होता है

Note : राइबोसोम को प्रोटीन की कैंपूरी कहते हैं

✓ Ques केंद्रक क्या है ? इसकी संरचना व कार्य लिखिए।
Ans सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। केंद्रक कोशिका के मध्य में बेलुकी जिल्ली से घिरा हुई गोलाकार संरचना है। केंद्रक के मध्य में आनुवांशिक पदार्थ DNA पाया जाता है। प्लेस्मिड में मिलने वाले पदार्थ को जो क्षारीय रंग से रंजित हो जाता है उसे क्रोमेटिन नाम दिया। केंद्रक के अन्दर केंद्रीका पाई जाती है। केंद्रक की बाहरी जिल्ली को बाह्य जिल्ली तथा भीतरी जिल्ली आन्तरिक जिल्ली कहते हैं। दोनों जिल्लियों के मध्य के छेद रंध्रों को रिफेन्ड्रिय अवकाश कहते हैं। ये छेद केंद्रकीय जिल्ली में कुछ छिद्र पाये जाते हैं जिन्हें केंद्रकीय छिद्र कहते हैं।



चित्र: — केन्द्रक की संरचना

कार्य : — (1) केन्द्रक कोशिका की सम्पूर्ण क्रिया को नियंत्रित करने का कार्य करता है, केन्द्रक कोशिका की वृद्धि तथा विभाजन में सहायक होता है, केन्द्रक में अनुवांशिक पदार्थ DNA पाया जाता है जो अनुवांशिक गुणों का निधारण करता है, केन्द्रक के चारों ओर केंद्रीय झिल्ली में कुछ छिद्र पाये जाते हैं जो RNA, प्रोटीन कोशिका द्रव्य के परिवहन में सहायक होते हैं।

नोट : — (1) रक्तनक्षारी की में केन्द्रक नहीं होता है। RBC तथा चालनी नलिका केन्द्रक कोशिका के कोशिका द्रव में एकसे बड़ा कोशिका अंग है।

③ केन्द्रक को कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं।

Ques. गुणसूत्र क्या हैं? गुणसूत्र किन्तु के आधार पर गुणसूत्र किन्तु के प्रकार कितने होते हैं?

Ans. कोशिका विभाजन के समय केन्द्रक में एक जालिका के समान संरचना मिलती है जिसे क्रोमेटिन जाल कहते हैं। इस क्रोमेटिन जाल के ही सङ्कुचित होने पर गुणसूत्र कहते हैं। मानव में 23 जोड़े / 46 गुणसूत्र पाये जाते हैं जो अनुवांशिक गुणों का निधारण करते हैं। 1 से लेकर 22 वें जोड़े तक के गुणसूत्रों को आसिक गुणसूत्र कहते हैं तथा 23 वें जोड़े को लिंग गुणसूत्र कहते हैं जो लिंग का निधारण करते हैं।

सर्वप्रथम गुणसूत्र की खोज रॉबर्ट ब्रॉस वॉर ने की थी, तथा गुणसूत्र शब्द वाल्डेयर ने दिया था।

Note : प्रत्येक गुणसूत्र की सुझाई लंबाई निम्न बिन्दु पर मिलती है। इसे गुणसूत्र बिन्दु (सेन्ट्रोमियर) कहते हैं।

गुणसूत्र बिन्दु के आधार पर गुणसूत्र निम्न प्रकार के होते हैं।

(कोसेन्ट्रीक)

Date: _____ Page no: _____

i) टीलोसेन्ट्रीक :-

इस प्रकार के गुणसूत्र में गुणसूत्र बिन्दु गुणसूत्र की भुजा के एक सिरे पर स्थित होता है उसे टीलोसेन्ट्रीक गुणसूत्र कहते हैं।




ii) एकोसेन्ट्रीक गुणसूत्र :-

ऐसा गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिन्दु दोनों भुजाओं के बीच में होता है परन्तु एक भुजा बड़ी होती है तथा एक भुजा अत्यधिक छोटी होती है।



iii) मेटासेन्ट्रीक :-

ऐसा गुणसूत्र जिसमें दोनों भुजाएँ बराबर होती हैं जिसके मध्य में गुणसूत्र बिन्दु पाया जाता है। इसका आकार अंग्रेजी के 'V' के समान होता है।



iv) एक मरसेन्ट्रीक :

ऐसा गुणसूत्र जिसमें एक गुणसूत्र और एक गुणसूत्र छोटी होती है। इन दोनों के बीच में गुणसूत्र बिन्दु पाया जाता है। इसका आकार अंगूँठी के गुँठ के समान होता है।

Ques. हेरोफोमेटिन तथा यूफोमेटिन में अंतर लिखिए।

हेरोफोमेटिन

यूफोमेटिन

i) यह मोटे कुण्डित व अत्यधिक संघनित धागे के समान संरचना होती है।

यह पतली अकुण्डित धागे के समान संरचना होती है।

ii) यह गहरे रंग की होती है।

यह हल्के रंग की होती है।

iii) यह अनुवांशिक रूप से असक्रिय होती है।

यह अनुवांशिक रूप से सक्रिय होती है।

iv) यह नाभिक में कम हिस्सा घेरती है।

यह नाभिक में अधिक हिस्सा घेरती है।

Ques. गॉस्मिऑन क्या है? इसकी संरचना को समझाइए।

Ans. यह पादप तथा जन्तु दोनों प्रकार की कोशिकाओं

में केन्द्रक के पास धनी रजित जालिकावत संरचना होती है। इसकी रोज नामक वैज्ञानिक ने 1898 की में खंडोर्न खड़े बिल्ली / उल्लू की तारिका कोशिका में देखा था।

इसकी संरचना को देखने पर बहुत सारी डिस्क के आकार की चपटी थैली के समान संरचनाओं से मिलकर बनी होती है। इसमें दो सिरे होते हैं जो उत्तल सिरा होता है जिसे सिरा कहते हैं तथा अवतल सिरे को हांस कहते हैं।


कार्य :- ① गॉल्जीकाय का प्रमुख कार्य है के जीन करके अन्तःकोशिकीय लक्ष्य अंगों तक पहुँचाने का होता है।

- ② गॉल्जीकाय ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करते हैं।
- ③ गुलाब का एक्रोसोम गॉल्जीकाय का बना होता है।

~~है~~

Note : — ① गोलजी काय में तीन डिब्बी युक्त संरचना पाई जाती है — गोलजी रिबिका (i) गोलजी सिस्टर्नी (ii) गोलजी पुटिकाएँ (iii) गोलजी रिबिका

② पादप कोशिकाओं में गोलजी काय को "Dictyosome" के नाम से जानते हैं।



महत्वपूर्ण बिन्दु —

- ① 16 सितम्बर को विश्व ओजोन दिवस बनाया जाता है,
- ② ~~Cell~~ एक लैटिन शब्द है जिसकी उत्पत्ति छोटे-छोटे कमरे होता है जिसका अर्थ "Cella" से हुआ है।
- ③ कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की।
- ④ रॉबर्ट हुक की पुस्तक माइक्रोग्राफिया (micrographia) के 18वें अध्याय में कोशिका का

- वर्णित किया गया है।
- (5) जीवित कोशिका की खोज एंटीनी कोन स्पूवेन डॉक ने 1676/1674 में की थी।
 - (6) कोशिका सिद्धान्त 1839 में खलीडन और श्वान ने दिया था।
 - (7) 1855 में रॉडोल्फ विर्रो ने आधुनिक कोशिका सिद्धान्त दिया।
 - (8) आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक "श्वानसन" को माना जाता है।
 - (9) भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक "A.K. Sharma" को कहा जाता है।
 - (10) हेंब्रिगेट ने कोशिका लेडीप्रोटेन्सी का विचार दिया। बाद में स्लीट ने माजरे में इसको स्थापित किया।
 - (11) सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की है।
 - (12) R.B.C का व्यास 7-8 μm (माइक्रोमीटर) होता है।
 - (13) सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है।
 - (14) सबसे बड़ा एककोशिकीय पौधा "एसीरा पुलेरिया" (शैवाल) का होता है।
 - (15) "जुलियस हव्सले" ने जीविकोप को जीवन का भौतिक आधार कहा है।
 - (16) केन्द्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी।
 - (17) माइक्रोप्लाज्मा ऐसा प्रोकैरियोटिक जीव है जिसमें (Cell wall) कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है।
 - (18) मिजासम जीवाणु का उपसन अंग होता है।
 - (19) माइक्रोकोन्ड्रिया के समरूप हैं।
 - (20) जीवाणु की कक्षाशिका में तीन भाग होते हैं -
 (i) ड्रक (अक्ष) (ii) आधारिय शरीर

- (20) सर्वप्रथम पुरकीने नामक वैज्ञानिक ने जीवद्रव्य को प्रोटोप्लाज्म (Protoplasm) नाम दिया।
- (21) जीवद्रव्य की गतियाँ निम्न प्रकार की होती हैं
 (i) जीवद्रव्य अग्रण (ii) धूलनि गति
 (iii) पहमाक्षी गति (iv) उम्मीबिग गति
- (22) केन्द्रक को कोशिका का नियंत्रण कहा करते हैं।
- (23) क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोईघर कहते हैं।
- (24) बहुकोशकीय जीवों में तीन प्रकार की कोशिकाएँ होती हैं - (i) अविकेदकीय कोशिका
 (ii) विकेदन कोशिका (iii) निविकेदन कोशिका
 (25) कोशिका भित्ति अजीवित संरचना है।
- (26) शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, पेक्टिन व मैनोंस की बनी होती है।
- (27) पाँचों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज व पेक्टिन की बनी होती है।
- (28) सेल्यूलोज एक पॉलीसैकेराइड है।
- (29) पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाला कार्बोपॉलीमर लिग्नेसेल्यूलोज है।
- (30) प्लाज्मोडैस्मा पादप कोशिका भित्ति में पाये जाते हैं।
- (31) प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का तबल मोजेक सोडल 1972 में सिंगर और निकोलसन ने दिया था।
- (32) माइकेल माइरोकोन्ड्रिया को अल्टमान ने कार्बोप्लास्ट (Bioplast) नाम दिया। और कोलीकष ने इसे राफेसोम नाम दिया।
- (33) माइकोन्ड्रिया की आन्तरिक झिल्ली में राफेसोमिक डी - हाइड्रोजेनेज एंजाइम पाया जाता है।

Q4 विरलोन प्रोटीन पांच प्रकार का होता है -

(i) H_1 (ii) H_{2A} (iii) H_{2B} (iv) H_3 (v) H_4

* Chapter :- 10 *

कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन

Q5 कोशिका चक्र क्या है, उसकी कितनी अवस्थाएँ होती हैं?

Ans कोशिका चक्र :- जीवों के शरीर में जब किसी नई कोशिका का निर्माण होता है वह कोशिका धीरे-धीरे अपने आकार में वृद्धि करती है उस प्रकार से वृद्धि करने के बाद अपने-आप को दो भागों में विभाजित कर लेती है। नई बनने वाली कोशिका पुनः वृद्धि करती है फिर और फिर से विभाजित हो जाती है इस प्रकार से यह प्रक्रिया चलती रहती है जिसे कोशिका चक्र कहते हैं।

मनुष्य की कोशिका प्रत्येक 24 घण्टे में विभाजित होती है परन्तु सीरल कोशिका में कोशिका चक्र पूर्ण होने में लगभग 90 मिनट लगता है व जीवाणु कोशिका में कोशिका चक्र 20 मिनट में पूर्ण होता है।

कोशिका चक्र की निम्न दो अवस्थाएँ होती हैं -

(i) अन्तरा अवस्था (Interphase)

(ii) विभाजन की अवस्था (M-phase)

(1) अन्तरा अवस्था :-

यह कोशिका चक्र की सबसे प्रथम अवस्था होती है। इस अवस्था में कोशिका अपने आप को विभाजन के लिए तैयार करती है इसलिए इसे तैयारी की अवस्था भी कहते हैं। यह अवस्था के क्रमिक अवस्थाओं के बीच की अवस्था है। इसलिए इसे अन्तरा अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को ~~विश्राम~~ विश्राम अवस्था के नाम से भी जाना जाता है।

इस अवस्था में मनुष्य की कोशिका के औसत 24 घण्टे की कोशिका चक्र अवधि में ही कोशिका विभाजन लगभग एक घण्टे में ही पूर्ण हो जाता है। अर्थात् 95% से अधिक समय अन्तरा अवस्था में लगता है। अन्तरा अवस्था की तीन उपअवस्थाएँ होती हैं — (i) G_1 अवस्था (ii) S अवस्था

(iii) G_2 अवस्था

(i) G_1 अवस्था (पूर्व संश्लेषण अवस्था) Pre-synthesis

(ii) S अवस्था (संश्लेषण अवस्था) Synthesis Phase

(iii) G_2 अवस्था (पश्च संश्लेषण अवस्था) post-synthesis

(1) G_1 अवस्था :-

यह अन्तरा अवस्था की

प्रथम अवस्था है इसमें कोशिका के सम्पूर्ण कोशिका अंगों का निगमि हो जाता है जिससे कोशिका अपने आकार में घटित कर लेती है।

2. अवस्था : — इस अवस्था में DNA का प्रतिक्रियिकरण (Replication/Duplication/द्विगुणन) इसके अलावा हिस्टोन प्रोटीन, सेन्ट्रोसोम का निगमि भी होता है।

3. अवस्था : — इस अवस्था में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, RNA अपनी संख्या को बढ़ाते हैं।

4. विभाजन की अवस्था : — इस अवस्था में कोशिका अपने-आप को विभाजित करती है, इस अवस्था को मातृकीय अवस्था के नाम से भी जाना जाता है।

कोशिका का निम्न विभाजन दो प्रकार से होता है —
केन्द्रक का विभाजन : —

विभाजन होता है जो इसे जब केन्द्रकीय द्रव कैरियोकाइनेसिस

(ii) कोशिका द्रव्य का विभाजन :- जब कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है तो उसे साइटोकाइनेस कहते हैं।

कोशिका विभाजन Cell Division

समसूत्री विभाजन

(mitosis)

असमसूत्री विभाजन

(meiosis)

> पूर्व अवस्था (ProPhase)

> मध्य अवस्था (metophase)

> पश्च अवस्था (anaphase)

> अन्त्यावस्था (Telophase)

असमसूत्री - I

असमसूत्री - II

(i) > पूर्व अवस्था - I

पूर्व अवस्था - II

(ii) > मध्यावस्था - I

मध्यावस्था - II

(iii) > पश्चावस्था - I

पश्चावस्था - II

(iv) > अन्त्यावस्था - I

अन्त्यावस्था - II

L - (लैटोलीन) Z - (जाइगोलीन)
P - (पेकाइलीन) D - (डिप्लोलीन)
Q - (गोइकाइनेसीस)

* कोशिका विभाजन :-

कोशिका चक्र में जब कोई

नई कोशिका बना लेती है तो यह प्रतिकूल करके दो भागों में विभाजित होकर पुनः कोशिकाओं का निर्माण करती है। कोशिका विभाजन मुख्यतः दो प्रकार का होता है -



समसूत्री विभाजन (mitosis) :-

जब एक मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है तो इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। इसमें बँटने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के बराबर होती है।

मातृ कोशिका में सद्रूपसंघार तथा जंतु कोशिका में कावैरी व फलमिंग ने समसूत्री कोशिका विभाजन की खोज की थी।

समसूत्री विभाजन में केन्द्रक विभाजन की निम्न अवस्थाएँ होती हैं -> (i) पूर्व अवस्था (ii) मध्य अवस्था (iii) पश्च अवस्था (iv) अन्त्यावस्था



पूर्व अवस्था :- यह केन्द्रक विभाजन की प्रथम अवस्था होती है। इसमें समय अधिक लगता है, केन्द्रक बड़ा व गोलाकार होता है। कोशिका द्रव्य सघन एवं संबंधित होकर एक जाल के समान संरचना बनाता है। इसे प्रोमेटिन जाल कहते हैं। इस अवस्था में केन्द्रकीय झिल्ली व केन्द्रका विघटित हो जाते हैं।



पश्च पूर्ववस्था



ii) मध्यावस्था : —

यह समसूत्री विभाजन की दूसरी अवस्था होती है। इस अवस्था में गुणसूत्र बिन्दु (सेन्ट्रोमियर) का कि मध्या रेखा पर आकर पंक्तिबद्ध व्यवस्थित हो जाते हैं।



iii) पश्चावस्था : —


यह समसूत्री विभाजन की तीसरी अवस्था होती है। इस अवस्था में गुणसूत्र बिन्दु का विभाजन हो जाता है और गुणसूत्र तंतुओं की सहायता से अपने-अपने ध्रुवों की ओर जाना प्रारंभ कर देते हैं।



iv) अन्त्यावस्था : —

यह समसूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था होती है। यह अवस्था पूर्ण विपरीत होती जिसमें केन्द्रकीय झिल्ली और केन्द्रिका कम पुनः बनना प्रारंभ हो जाती है।



पश्चावस्था



अन्त्यावस्था

कोशिका द्वय विभाजन :-

बाद कोशिका द्वय का विभाजन होता है और दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है।



अर्धसूत्री विभाजन क्या है इसके कितने चरण होते हैं समझाइए ?

अर्धसूत्री विभाजन :-

इसमें एक मातृ कोशिका से चार पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। इनमें वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका से आधी होती है। न्यूनकारी विभाजन के नाम से भी जाना जाता है।

अर्द्धसूत्री विभाजन को प्रथम बीजेन ने देखा
 तथा विस्तृत अध्ययन स्त्रासबर्गर ने किया
 तथा फार्मि ने इसे मियोसिस (meiosis) नाम
 दिया।
 अर्द्धसूत्री विभाजन दो चरणों में पूर्ण होता है -

(i) अर्द्धसूत्री - I (ii) अर्द्धसूत्री - II

1) अर्द्धसूत्री - I : - अर्द्धसूत्री प्रथम समसूत्री
 विभाजन के समान होता है। अर्द्धसूत्री प्रथम
 निम्न अवस्थाओं में पूर्ण होता है -

i) प्रवर्धन II -

यह अर्द्धसूत्री प्रथम की पहली
 अवस्था होती है जो समसूत्री विभाजन से समी
 मिलती है जिसकी पाँच उपवर्धन होती
 हैं - लेवेलीन : - इस अवस्था में गुणसूत्र
 धीरे-धीरे स्पष्ट दिखाई देने

लगते हैं।
 जाइगाटिन : -

यह अवस्था में समजात गुणसूत्र
 जोड़ बना लेते हैं जिसे सूत्र युग्मन (Synapsis)
 कहते हैं। इस अवस्था में विनलैनिमस

क्रॉसोवर्स बनता है।
 पकाइलीन : -

यह अवस्था अपेक्षाकृत छोटी होती है
 इस अवस्था में गुणसूत्रों का क्रॉसिंग ओवर
 (जीन विनिमय) होता है। अर्थात् DNA के खण्डों की
 आदला-बदली होती है।

डिलोरीन :

इस अवस्था में सिनेलोनिमल कॉम्पलेक्स का विघटन होना प्रारंभ हो जाता है परन्तु कुछ स्थानों पर समजात गुणसूत्र आपस में जुड़े होते हैं जहाँ पर जैसी संरचना बनती है जिसे क्रिप्टोमेरा कहते हैं।

डाइकाइनेन्सीस :

इस अवस्था में क्रिप्टोमेरा का उपान्वीभवन हो जाता है। कुछ कशेरुकी प्राणियों में यह अंतिम अवस्था होती है इसमें क्रिप्टोमेरा का अन्त होना प्रगता केन्द्रिका तथा केन्द्रीय जिल्ली का अन्त होना लगता है।

Note : — डिलोरीन अवस्था को एक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है।

मध्य अवस्था - I :

इस अवस्था में गुणसूत्र मध्य रेखा पर आकार व्यवस्थित हो जाते हैं।

पश्चावस्था - I :

इस अवस्था में समजात गुणसूत्र एक हो जाते हैं परन्तु गुणसूत्र बिन्दु जुड़े रहते हैं।

अन्त्यावस्था :

इस अवस्था में कोशिका स्वयं विभाजन प्रारंभ हो जाता है। दो पुत्री कोशिका का निर्माण होता है।

और केन्द्रीय डिस्क तथा केन्द्रिका का निर्माण पुनः प्रारंभ हो जाता है।

Note :- दो अर्द्धसूत्री विभाजन के बीच की अवस्था को अन्तराला अवस्था या इन्टरकाइनेसिस कहते हैं।

2) अर्द्धसूत्री - II :- यह समान्यतः समसूत्री विभाजन जैसा होता है। अर्द्धसूत्री प्रथम में गुणसूत्रों को आधी हो जाते हैं परन्तु DNA की मात्रा के अर्द्धसूत्री - II में कम किया जाता है। अर्द्धसूत्री - II के विपक्षि अर्द्धसूत्री - II होता है। इसकी चार अवस्थाएँ होती हैं -

i) पूर्ववस्था - II :- यह ठीक समसूत्री विभाजन की पूर्ववस्था के समान होती है। इसमें केन्द्रीय डिस्क तथा केन्द्रिका विघुट हो जाती है।

ii) मध्यावस्था - II :- इस अवस्था में गुणसूत्र मध्य रेखा पर आकर व्यवस्थित हो जाते हैं।

iii) पश्चावस्था - II :- इस अवस्था में गुणसूत्र विन्दु का विभाजन हो जाता है। इससे गुणसूत्रों में DNA की मात्रा आधी हो जाती है।

V) अन्त्यावस्था - II :-


अन्तिम अवस्था होती है यह अहर्बुत्री - II की अवस्था के विपरीत होती है। इसमें यह पुनर्विस्था पुनः वनने लगती है और अन्त में चार अगुणित पुत्री कोशिका प्राप्त होती है।

अहर्बुत्री विभाजन का महत्त्व :-

विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो लैंगिक जनन करने वाले जीवों की जनन कोशिकाओं में होता है। इसके द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है या स्थिर बनी रहती है।

समसूत्री विभाजन	अहर्बुत्री विभाजन
इसमें एक मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसमें वनने वाली पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। समसूत्री विभाजन की पश्चात् अवस्था में गुणसूत्र बिन्दु का विभाजन हो जाता है।	इसमें एक मातृ कोशिका से चार पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसमें वनने वाली कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका से आधी होती है। इसमें पश्चात् अवस्था - I में गुणसूत्र बिन्दु का विभाजन नहीं होता है परन्तु पश्चात् अवस्था - II में हो जाता है।

- 4) यह एक समी कारिक क्रियाओं में होता है। यह जनन क्रियाओं में होता है।
- 5) यह केवल एक ही चरण में होता है। यह दो चरणों में होता है।



अर्द्धसूत्री विभाजन की विभिन्न अवस्थाएँ -

सहस्रपूर्ण बिन्दु :

- i) क्रिया चक्र की अवस्था में DNA का प्रतिकृति (प्रतिलिपिकरण) होता है।
- ii) क्रिया चक्र की प्रथम अवस्था का 95% से अधिक का समय अन्तरा अवस्था में लगा जाता है।

iii) M - अवस्था का आरंभ केन्द्रक विभाजन से होता है।
 ii) मनुष्य में कोशिका चक्र का समय 24 घण्टे का होता है।

i) गीस्ट कोशिका में कोशिका चक्र पूर्ण होने में लगभग 90 मिनट का समय लगता है।
 ii) कुछ अमूर्ण कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती हैं। जैसे - जर मधुमक्खियों कोशिका चक्र में कुछ कोशिकाएं G₁ - अवस्था से निकलकर निष्क्रिय अवस्था में पहुँच जाती हैं, जहाँ पर कोशिका विभाजित नहीं होती हैं, जो उपापचयी रूप से सक्रिय होती हैं इस अवस्था को G₀ - अवस्था कहते हैं।

M - अवस्था कोशिका चक्र की सर्वाधिक गतिमय अवस्था है।
 इस वसायन जो समसूत्री विभाजन को रोक देता है उसे समसूत्री विष कहते हैं।
 जैसे - राइबो न्यूक्लिक "न्यूबिलरस" "कोलचीसीन"
 कोलचीसीन कोलचीकस ब्रुल्युटिगम नामक पौधे से प्राप्त होता है, जो "मिथिएसी कुल" का है।