


Chapter # 3

समतल में गति (द्विविमीय गति)


Q. सादृश एवं अदृश में अन्तर लिखिए।

सादृश	अदृश
1) वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिये परिमाण के साथ-साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है सादृश राशियाँ कहलाती हैं।	वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिये केवल परिमाण की आवश्यकता होती है दिशा की नहीं अदृश राशियाँ कहलाती हैं।
2) सादृश राशियों का जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग सामान्य बीजगणितीय नियमों द्वारा हल नहीं किया जा सकता है।	अदृश राशियों का जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग सामान्य बीजगणितीय नियमों द्वारा हल किया जा सकता है।
3) सादृश राशियों का परिमाण घनात्मक, त्रिघात्मक एवं शून्य भी हो सकता है।	अदृश राशियों का परिमाण मात्र घनात्मक होता है या फिर शून्य होता है।
उदा:- विस्थापन, वेग, त्वरण, बल आदि।	उदा:- द्रव्यमान, समय, ऊर्जा, तापमान आदि।

सदिशों का प्रदर्शन (निरूपण) :- [सदिश = परिमाण + दिशा]



सदिश राशियों को ग्राफ पर एक सरल रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तब उस सरल रेखा की लम्बाई सदिश के परिमाण की एवं सरल रेखा का तीर सदिश की दिशा उसके अक्ष के साथ बनाए गए कोण से प्रदर्शित होती है।




सदिशों का समानान्तरण स्थानान्तरण :-

parallel shifting of vectors

एक सदिश को एक जगह से दूसरी जगह स्थानान्तरित कर सकते हैं बस हमें दो बातों का ध्यान रखना होता है

- i) सदिश की लम्बाई में कोई परिवर्तन न हो।
- ii) सदिश के कोण (दिशा) में कोई भी परिवर्तन न हो।




दो सादियों के मध्य कोण ज्ञात करना :-

जब दो सादियों के मध्य कोण देखा जाता है तो या तो दोनों सादियों की Tail एक दूसरे से मिलनी चाहिए या फिर Head एक दूसरे से मिलना चाहिए।

दो सादियों का कोण सदैव इस प्रकार लिया जाता है कि कोण का मान 180° से अधिक न हो $[0^\circ < \theta < 180^\circ]$

दो सादियों के मध्य कोण :-




सादियों के योग के नियम :-

- 1) सादियों के योग का समान्तर चतुर्भुज नियम -
- 2) सादियों के योग का त्रिभुज नियम -
- 3) सादियों के योग का बहुभुज नियम -

1) सादियों के योग का समान्तर चतुर्भुज नियम :-

यदि दो सादियों को किसी समान्तर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए तो उनका परिणामी उन दोनों भुजाओं के मिलान बिन्दु से जाने वाले विकर्ण द्वारा विपरित दिशा में प्रदर्शित किया जाता है।




$$\vec{R} = \vec{A} + \vec{B}$$

परिणामी का परिमाण $[R^2 = A^2 + B^2 + 2AB \cos \theta]$

परिणामी की दिशा $[\tan \alpha = \frac{B \sin \theta}{A + B \cos \theta}]$

2) सदिशों के योग का त्रिभुज नियम $\Rightarrow$ यदि दो सदिशों को किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा एक ही दिशा में प्रदर्शित किया जाए तो उनका परिणामी त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत दिशा में प्रदर्शित होगा।





$$R^2 = A^2 + B^2 + 2AB \cos \theta$$

$$\tan \alpha = \frac{B \sin \theta}{A + B \cos \theta}$$


3) सदिशों के योग का बहुभुज नियम :-

जब दो से अधिक सदिशों को जोड़ना हो तो इस नियम का उपयोग किया जाता है। इस नियमानुसार यदि दो सदिशों से अधिक सदिशों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि वह एक बहुभुज का निर्माण करें एवं सभी समान दिशा में हो तो इन सदिशों का परिणामी उस भुजा द्वारा निरूपित किया जाएगा जो कि इस बहुभुज को बन्द करेगी एवं विपरीत दिशा में होगी।



$$\vec{R} = \vec{A} + \vec{B} + \vec{C} + \vec{D}$$

समान्तर चतुर्भुज के नियम से सदिशों के योग का व्यंजक :-



સમકોણ ત્રિકોણ $\triangle QTS$

$$\sin \theta = \frac{\text{ભમ્બ}}{\text{કર્ણ}}$$

$$\sin \theta = \frac{QS}{QT}$$

$$\sin \theta = \frac{QS}{B}$$

$$\boxed{QS = B \sin \theta}$$

જો $\cos \theta = \frac{\text{આધાર}}{\text{કર્ણ}}$

$$\cos \theta = \frac{TS}{QT}$$

$$\cos \theta = \frac{TS}{B}$$

$$\boxed{TS = B \cos \theta}$$

સમકોણ ત્રિકોણ $\triangle QTS$ માં પાટ સે

$$(\text{કર્ણ})^2 = (\text{ભમ્બ})^2 + (\text{આધાર})^2$$

$$(RQ)^2 = (QS)^2 + (TS)^2$$

$$R^2 = (B \sin \theta)^2 + (A + B \cos \theta)^2$$

$$\boxed{[A + B]^2 = A^2 + B^2 + 2AB}$$

$$R^2 = B^2 \sin^2 \theta + A^2 + B^2 \cos^2 \theta + 2AB \cos \theta$$

$$R^2 = A^2 + B^2 (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) + 2AB \cos \theta$$

$$[R^2 = A^2 + B^2 + 2AB \cos \theta]$$


तथा किंवा

$$\tan \alpha = \frac{\text{लम्बा}}{\text{आधार}}$$

$$\tan \alpha = \frac{QS}{OS}$$

$$[\tan \alpha = \frac{B \sin \theta}{A + B \cos \theta}] \text{ Ans}$$

Q. निम्न चित्र में दर्शाये गये सदिशों का परिणामी ज्ञात कीजिए ?



दिया है :-

$$A = 6$$

$$B = 6$$

$$\theta = 60^\circ$$

$$R^2 = A^2 + B^2 + 2AB \cos \theta$$

$$R^2 = 6^2 + 6^2 + 2 \times 6 \times 6 \times \cos 60^\circ$$

$$R^2 = 36 + 36 + 2 \times 36 \times \frac{1}{2}$$

$$R^2 = 3 \times 36$$

$$R^2 = \sqrt{3 \times 6 \times 6}$$

$$R^2 = 6\sqrt{3}$$

$$\tan \alpha = \frac{B \sin \theta}{A + B \cos \theta}$$

$$\tan \alpha = \frac{3 \times 6 \times \frac{\sqrt{3}}{2}}{6 + \frac{6 \times 3}{2}}$$


$$\tan \alpha = \frac{9\sqrt{3}}{9}$$

$$\tan \alpha = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}}$$


$$\tan \alpha = \frac{1}{1}$$

$$\tan \alpha = \tan 30^\circ$$


$$\alpha = 30^\circ \text{ Ans}$$




ii)




iii)



iv)



सदिशों का वियोजन =



क्षैतिज घटक

समकोण $\triangle OAB$ में

$$\cos \theta = \frac{\text{आधार}}{\text{कर्ण}}$$

$$\cos \theta = \frac{A_x}{A}$$

$$A_x = A \cos \theta$$

N/A

$$\sin \theta = \frac{\text{opp}}{\text{hyp}}$$

$$\sin \theta = \frac{Ay}{A}$$

$$Ay = A \sin \theta$$

सदिशों के प्रकार :-

1) समान सदिश $\Rightarrow$ दो सदिशों की तब समान कहा जाता है जब उनकी माप और दिशा एक जैसी हो।

$$\begin{array}{c} \vec{A} \\ \vec{B} \end{array} \quad \vec{A} = \vec{B}$$

(2) असमान सदिश $\Rightarrow$ यदि दो सदिशों की दिशा एवं मापों में से कोई एक भी अलग हो तो इस प्रकार के सदिशों को असमान सदिश कहते हैं।

$$\begin{array}{c} \vec{A} \\ \vec{B} \end{array} \quad \vec{A} \neq \vec{B}$$


3) समान्तर सदिश $\Rightarrow$ दो सदिशों के समान्तर सदिश कहेंगे यदि उनकी दिशाएँ समान हों।

$$\begin{array}{c} \vec{A} \\ \vec{B} \end{array} \quad \vec{A} \parallel \vec{B}$$

दो समान्तर सदिशों के मध्य कोण 0° होता है।

4) असमान्तर सदिश $\Rightarrow$
(प्रतिसमान्तर)

वे सदिशों को असमान्तर सदिश कहेंगे यदि इन दोनों की दिशाएँ एक-दूसरे के विपरीत हों।



5) शून्य सदिश $\Rightarrow$

ऐसा सदिश वह सदिश जिसका मापानु शून्य हो एवं जिसकी दिशा कुछ भी हो जा सके शून्य सदिश कहते हैं।

6) एकांक सदिश $\Rightarrow$

एकांक सदिश वह सदिश होते हैं जिनका मापानु 1 होता है एवं एकांक सदिश का उपयोग केवल भौतिक राशियों की दिशा बताने के लिए किया जाता है।


★ एकांक सदिश का लक्षण $\Rightarrow$

$\vec{A}$ का एकांक सदिश $\hat{A}$
 $\vec{B}$ का एकांक सदिश $\hat{B}$

सदिश = मापानु $\times$ दिशा

$$\vec{A} = |\vec{A}| \hat{A}$$

$$\hat{A} = \frac{\vec{A}}{|\vec{A}|}$$



Note :-

$$|\hat{i}| = 1$$

$$|\hat{j}| = 1$$

$$|\hat{k}| = 1$$

सदिशों का कार्टिस रूप :-

जिसी सदिश को एकांक सदिशों $(\hat{i}, \hat{j}, \hat{k})$ के रूप में प्रदर्शित करने के लिए जिन समीकरणों का उपयोग किया जाता है, उन्हें सदिशों का कार्टिस रूप कहते हैं।

i) उदा :- $\vec{A} = 3\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}$

$\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$
 A_x A_y A_z

$$A_x = 3$$

$$A_y = -2$$

$$A_z = 1$$

ii) $\vec{B} = 4\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k}$

$\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$
 B_x B_y B_z

$$B_x = 4$$

$$B_y = 3$$

$$B_z = -1$$

$$\text{iii) } [\vec{C} = \hat{i} + \hat{j}]$$

$$C_x = 0$$

$$C_y = 1$$

$$C_z = 1$$

★ सदिशों के कार्टिस रूप से सदिशों का मापांक ज्ञात करना :-

$$|\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$$

$$\text{ex: (i) } \vec{A} = 4\hat{i} + 3\hat{j}$$

$$|\vec{A}| = \sqrt{4^2 + 3^2}$$

$$|\vec{A}| = \sqrt{16 + 9}$$

$$|\vec{A}| = \sqrt{25}$$

$$|\vec{A}| = 5 \text{ Ans}$$

$$(2) \vec{A} = -2\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k}$$

$$|\vec{A}| = \sqrt{(-2)^2 + 3^2 + (-1)^2}$$

$$|\vec{A}| = \sqrt{4 + 9 + 1}$$

$$|\vec{A}| = \sqrt{14} \text{ Ans}$$

मापांक ज्ञात किए गए :-

$$(i) \vec{A} = 2\hat{i} + 5\hat{k}$$

$$|\vec{A}| = \sqrt{2^2 + 5^2}$$

$$|\vec{A}| = \sqrt{4 + 25}$$

$$|\vec{A}| = \sqrt{29} \text{ Ans}$$

$$(i) \vec{A} = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$$

$$\text{Sol} \quad |\vec{A}| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2}$$

$$|\vec{A}| = \sqrt{3} \text{ Ans}$$

$$(ii) \vec{A} = 3\hat{i} + 4\hat{k}$$

$$\text{Sol} \quad |\vec{A}| = \sqrt{3^2 + 4^2}$$

$$|\vec{A}| = \sqrt{9+16}$$

$$|\vec{A}| = \sqrt{25}$$

$$|\vec{A}| = 5 \text{ Ans}$$

कार्टिस रूप में सदिशों की दिशा ज्ञात करना :-

(कार्टिस रूप में सदिशों का एकांक सदिश)

$$\hat{A} = \frac{\vec{A}}{|\vec{A}|}$$

उदा:- $\vec{A} = 2\hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k}$ इसकी दिशा ज्ञात कीजिए।
~~इस दिशा~~ इस सदिश की दिशा में एकांक सदिश
 ज्ञात कीजिए।

$$|A| = \sqrt{2^2 + 3^2 + 1^2}$$

$$|A| = \sqrt{4 + 9 + 1}$$

$$|A| = \sqrt{14}$$

$$\hat{A} = \frac{\vec{A}}{|A|}$$

$$\hat{A} = \frac{2\hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k}}{\sqrt{14}}$$

$$\vec{A} = \frac{2\hat{i}}{\sqrt{14}} + \frac{3\hat{j}}{\sqrt{14}} + \frac{\hat{k}}{\sqrt{14}}$$

$\vec{A}$ के अनुदिश एकांक सदिश ज्ञात करना :

$$1) \vec{A} = \hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}$$

$$\text{एव } |A| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2}$$

$$|A| = \sqrt{1 + 4 + 4}$$

$$|A| = \sqrt{9}$$

$$|A| = 3 \text{ मू.}$$

$$\hat{A} = \frac{\vec{A}}{|A|}$$

$$\hat{A} = \frac{\hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}}{3}$$

$$\hat{A} = \frac{\hat{i}}{3} + \frac{2\hat{j}}{3} + \frac{2\hat{k}}{3}$$

$$(i) \vec{A} = \hat{i} + \hat{j}$$

$$|A| = \sqrt{1^2 + 1^2}$$

$$|A| = \sqrt{1+1}$$

$$|A| = \sqrt{2}$$

$$\hat{A} = \frac{\vec{A}}{|A|}$$

$$\hat{A} = \frac{\hat{i} + \hat{j}}{\sqrt{2}}$$

$$\hat{A} = \frac{\hat{i}}{\sqrt{2}} + \frac{\hat{j}}{\sqrt{2}}$$

$$(iii) \vec{A} = 4\hat{i} - \hat{j} - \hat{k}$$

$$|A| = \sqrt{4^2 + (-1)^2 + (-1)^2}$$

$$|A| = \sqrt{16 + 1 + 1}$$

$$|A| = \sqrt{18}$$

$$|A| = \sqrt{3 \times 3 \times 2}$$

$$|A| = 3\sqrt{2}$$

$$\hat{A} = \frac{\vec{A}}{|A|}$$

$$\hat{A} = \frac{4\hat{i} - \hat{j} - \hat{k}}{3\sqrt{2}}$$

कार्तीय रूप में सदिशों की जोड़ना एवं घटाना :-

Ex : यदि $\vec{A} = \hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$
 एवं $\vec{B} = \hat{i} + \hat{j} + 4\hat{k}$

ज्ञात किजिए (i) $\vec{A} + \vec{B}$, (ii) $\vec{A} - \vec{B}$

$$(i) \vec{A} + \vec{B} = (\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}) + (\hat{i} + \hat{j} + 4\hat{k})$$

$$= 2\hat{i} + 3\hat{j} + 3\hat{k}$$

$$\begin{aligned}\text{(ii)} \quad \vec{A} - \vec{B} &= (\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}) - (\hat{i} + \hat{j} + 4\hat{k}) \\ &= \hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k} - \hat{i} - \hat{j} - 4\hat{k} \\ &= \hat{j} - 5\hat{k}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\star \quad \vec{A} &= 3\hat{i} + 4\hat{j} - 3\hat{k} \\ \vec{B} &= \hat{i} - \hat{j} - \hat{k}\end{aligned}$$

$$\text{i) } \vec{A} + \vec{B} \quad \text{(ii) } \vec{A} - \vec{B} \quad \text{(iii) } \vec{B} - \vec{A}$$

$$\begin{aligned}\text{Ex (i) } \vec{A} + \vec{B} &= (3\hat{i} + 4\hat{j} - 3\hat{k}) + (\hat{i} - \hat{j} - \hat{k}) \\ &= 3\hat{i} + 4\hat{j} - 3\hat{k} + \hat{i} - \hat{j} - \hat{k} \\ &= 4\hat{i} + 3\hat{j} - 4\hat{k}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{(ii) } \vec{A} - \vec{B} &= (3\hat{i} + 4\hat{j} - 3\hat{k}) - (\hat{i} - \hat{j} - \hat{k}) \\ &= 3\hat{i} + 4\hat{j} - 3\hat{k} - \hat{i} + \hat{j} + \hat{k} \\ &= 2\hat{i} + 5\hat{j} - 2\hat{k}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{(iii) } \vec{B} - \vec{A} &= (\hat{i} - \hat{j} - \hat{k}) - (3\hat{i} + 4\hat{j} - 3\hat{k}) \\ &= \hat{i} - \hat{j} - \hat{k} - 3\hat{i} - 4\hat{j} + 3\hat{k} \\ &= -2\hat{i} - 5\hat{j} + 2\hat{k}\end{aligned}$$

$$\star \vec{A} = \hat{i} + \hat{j} \quad \vec{B} = \hat{j} - \hat{k}$$

$$(i) \vec{A} + \vec{B} \quad (ii) \vec{A} - \vec{B} \quad (iii) \vec{B} - \vec{A}$$

$$\text{Sol (i) } \vec{A} + \vec{B} = (\hat{i} + \hat{j}) + (\hat{j} - \hat{k})$$

$$= \hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$$

$$\vec{A} - \vec{B} = (\hat{i} + \hat{j}) - (\hat{j} - \hat{k})$$

$$= \hat{i} + \hat{j} - \hat{j} + \hat{k}$$

$$= \hat{i} + \hat{k}$$

$$\vec{B} - \vec{A} = (\hat{j} - \hat{k}) - (\hat{i} + \hat{j})$$

$$= \hat{j} - \hat{k} - \hat{i} - \hat{j}$$

$$= -\hat{k} - \hat{i}$$

$\star$ दो सदिशों का गुणनफल :- दो सदिशों का गुणन निम्न प्रकार से किया जा सकता है ।

- i) सदिश $\times$ सदिश = सदिश
- ii) सदिश $\times$ सदिश = असदिश
- iii) सदिश $\times$ सदिश = सदिश

1) आवेक $\times$ सदिश = सदिश

उदा:- यदि $\vec{A} = 2\hat{i} - \hat{j} + 4\hat{k}$ तब ज्ञात किया जाए
 (i) $2\vec{A}$ (ii) $\frac{3}{2}\vec{A}$ (iii) $-3\vec{A}$ (iv) $-\vec{A}$

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad 2\vec{A} &= 2(2\hat{i} - \hat{j} + 4\hat{k}) \\ &= 4\hat{i} - 2\hat{j} + 8\hat{k} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(ii)} \quad \frac{3}{2}\vec{A} &= \frac{3}{2}(2\hat{i} - \hat{j} + 4\hat{k}) \\ &= \frac{3}{2} \cdot 2\hat{i} - \frac{3}{2}\hat{j} + \frac{3}{2} \cdot 4\hat{k} \\ &= 3\hat{i} - \frac{3}{2}\hat{j} + 6\hat{k} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(iii)} \quad -3\vec{A} &= -3(2\hat{i} - \hat{j} + 4\hat{k}) \\ &= -6\hat{i} + 3\hat{j} - 12\hat{k} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(iv)} \quad -\vec{A} &= -1(2\hat{i} - \hat{j} + 4\hat{k}) \\ &= -2\hat{i} + \hat{j} - 4\hat{k} \end{aligned}$$

सदिशों का आवेक गुणन $\Rightarrow$ जब दो सदिशों का गुणन इस प्रकार किया जाये कि उनके प्राप्त होने वाला उत्तर एक आवेक राशि हो तो इस प्रकार के गुणनफल को सदिशों का आवेक गुणन कहते हैं।

इस गुणन फल को (dot product) डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है।

$$\text{सदिश } \times \text{ सदिश} = \text{अदिश}$$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}| |\vec{B}| \cos \theta \quad [\text{जहाँ } \theta - \text{दोनों सदिशों का मध्यकोण है}]$$

एकांक सदिशों का अदिश गुणन $(\hat{i}, \hat{j}, \hat{k})$

$$\hat{i} \cdot \hat{i} = |\hat{i}| |\hat{i}| \cos 0^\circ$$

$$= 1 \times 1 \times 1$$

$$= 1$$

$$\hat{j} \cdot \hat{j} = |\hat{j}| |\hat{j}| \cos 0^\circ$$

$$= 1 \times 1 \times 1$$

$$= 1$$

$$\hat{k} \cdot \hat{k} = |\hat{k}| |\hat{k}| \cos 0^\circ$$

$$= 1 \times 1 \times 1$$

$$= 1$$


$$\hat{i} \cdot \hat{j} = |\hat{i}| |\hat{j}| \cos 90^\circ$$

$$= 1 \times 1 \times 0$$

$$= 0$$

$$\hat{j} \cdot \hat{k} = 0$$

$$\hat{k} \cdot \hat{i} = 0$$



Q. यदि $\vec{A} = 2\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k}$ तथा $\vec{B} = \hat{i} + 4\hat{j} - 2\hat{k}$
 हो तो $\vec{A} \cdot \vec{B}$ का मान ज्ञात कीजिए ?

$$\begin{aligned} \text{Ans } \vec{A} \cdot \vec{B} &= (2\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k}) \cdot (\hat{i} + 4\hat{j} - 2\hat{k}) \\ &= 2 + 12 + 2 \\ &= 16 \text{ Ans} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ii) } \vec{A} &= \hat{i} + \hat{j} + \hat{k} \\ \vec{B} &= -\hat{i} - 2\hat{j} - 3\hat{k} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Ans } \vec{A} \cdot \vec{B} &= (\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}) \cdot (-\hat{i} - 2\hat{j} - 3\hat{k}) \\ &= -1 - 2 - 3 \\ &= -6 \text{ Ans} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(iii) } \vec{A} &= 2\hat{i} + \hat{j} \\ \vec{B} &= \hat{j} - \hat{k} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Ans } \vec{A} \cdot \vec{B} &= (2\hat{i} + \hat{j}) \cdot (\hat{j} - \hat{k}) \\ &= 0 + 1 - 0 \\ &= 1 \end{aligned}$$

Q. यदि $\vec{A} = 2\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k}$ तथा $\vec{B} = \hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$ हो तो $\vec{A}$ एवं $\vec{B}$ परस्पर एक-दूसरे के लम्बवत होंगे या नहीं का मान ज्ञात कीजिए ?

Ans. [यदि दो सदिश एक-दूसरे के लम्बवत हों तो $\vec{A} \cdot \vec{B} = 0$ हो जाता है।]

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = 0 \quad [\vec{A} \perp \vec{B}]$$

$$(2\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k}) \cdot (\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}) = 0$$

$$2 + 3 + 2 = 0$$

$$5 + 2 = 0$$

$$2 = -5 \text{ गलत}$$

(3) सदिशों का सदिश गुणन :

$$(\text{सदिश} \times \text{सदिश} = \text{सदिश})$$

दो सदिशों का गुणा करने पर यदि उत्तर में भी एक सदिश प्राप्त होता है तो उसे सदिशों का सदिश गुणन कहते हैं। इसे (cross product) भी कहते हैं।

$$[\vec{A} \times \vec{B}] = |\vec{A}| |\vec{B}| \sin \theta \hat{n}$$

[जहाँ $\hat{n}$, $\vec{A}$ एवं $\vec{B}$ के सम्बन्धित एकांक सदिश होगा]

एकांक सदिशों का सदिश गुणन :-


$$(\hat{i}, \hat{j}, \hat{k})$$

$$\hat{i} \times \hat{i} = |\hat{i}| |\hat{i}| \sin 0^\circ \hat{n}$$

$$= 0$$

$$\hat{j} \times \hat{j} = 0$$

$$\hat{k} \times \hat{k} = 0$$



different =


$$\hat{i} \times \hat{j} = |\hat{i}| |\hat{j}| \sin 90^\circ \hat{k}$$

$$= 1 \times 1 \times 1 \times \hat{k}$$

$$\hat{j} \times \hat{i} = -\hat{k}$$

$$\hat{j} \times \hat{k} = \hat{i}$$

$$\hat{k} \times \hat{j} = -\hat{i}$$



$$\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}$$

$$\hat{j} \times \hat{k} = \hat{i}$$


$$\hat{k} \times \hat{i} = \hat{j}$$

दो सदिशों के सदिश गुणन की दिशा ज्ञात करना :-

दो सदिशों के सदिश गुणन की दिशा ज्ञात करने के लिए हम दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम का उपयोग करते हैं।

इस नियमानुसार दाहिने हाथ के अंगूठे एवं अंगुलियों की इस प्रकार की जाया जाए कि वह एक दूसरे के लम्बवत हो तब सदिश के गुणन के दौरान प्रथम सदिश से दूसरे सदिश की ओर जाने पर अंगुलियों की उस दिशा में घुमाना है तब अंगूठा सदिश गुणन के परिणामी की प्रदर्शित करता है।

$(\vec{A} \times \vec{B})$ की दिशा
 $(\vec{B} \times \vec{A})$ की दिशा



Q. यदि $\vec{A} = 2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$ तथा $\vec{B} = 2\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}$ तब ज्ञात किजिए $\vec{A} \times \vec{B}$

Solve:-

	$\hat{i}$	$\hat{j}$	$\hat{k}$
$\vec{A} \times \vec{B}$	2	-1	2
	2	1	-1

$$= +\hat{i}[1-2] - \hat{j}[-2-4] + \hat{k}[2-2]$$

$$= -\hat{i}(-1) - \hat{j}(-6) + \hat{k}(0)$$

$$= \hat{i} + 6\hat{j} + 0\hat{k}$$

$$\vec{A} = \hat{i} + \hat{j} - \hat{k}$$

$$\vec{B} = 2\hat{i} - 3\hat{j} - 2\hat{k}$$

$$\vec{A} \times \vec{B} = ?$$

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & -3 & -2 \end{vmatrix}$$

$$= \hat{i}[-2 \times 3] + \hat{j}[-2 - (-2)] + \hat{k}[-3 - 2]$$

$$= -5\hat{i} = \hat{i}(-5) + \hat{j}(-2 + 2) + \hat{k}(-5)$$

$$= -5\hat{i} - 5\hat{k}$$

$$\text{ii) } \vec{A} = \hat{i} - \hat{j} - \hat{k}$$

$$\vec{B} = 2\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k}$$

$$\text{(i)} \vec{A} = \hat{i} + \hat{j}$$

$$\vec{B} = \hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$$

$$\text{i) } \vec{A} \times \vec{B} \quad \text{ii) } \vec{A} \cdot \vec{B}$$

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & -1 & -1 \\ 2 & 3 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= \hat{i}[1 + 3] - \hat{j}[-1 + 2] + \hat{k}[3 + 2]$$

$$= \hat{i}(4) - \hat{j}(-1) + \hat{k}(5)$$

$$\boxed{= 4\hat{i} - \hat{j} + 5\hat{k}} \text{ Ans}$$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = (\hat{i} - \hat{j} - \hat{k}) \cdot (2\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k})$$

$$= 2 - 3 + 1$$

$$= 3 - 3$$

$$= 0 \text{ Ans}$$

$$(ii) \vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= \hat{i}[2 - 0] - \hat{j}[2 - 0] + \hat{k}[-1 - 1]$$

$$= \hat{i}(2) - \hat{j}(2) + \hat{k}(-2)$$

$$\boxed{= 2\hat{i} - 2\hat{j} - 2\hat{k}} \text{ Ans}$$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = (\hat{i} + \hat{j}) \cdot (\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k})$$

$$= 1 - 1 + 0$$

$$= 0 \text{ Ans}$$

#


प्रक्षेप्य गति

(projectile motion)

जब किसी वस्तु को पृथ्वी से किसी कोण पर फेंका जाता है एवं वह वस्तु गुरुत्वाकर्षण के अधीन मुक्त रूप से गति करते हुए इस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं एवं प्रक्षेप्य गति कर रही वस्तु को प्रक्षेपक कहते हैं।

Note - प्रक्षेप्य गति में वस्तु का मार्ग परवलयकार होता है।

प्रक्षेप्य गति :



वेग का क्षैतिज घटक

(x-अक्ष में गति)

$$u_x = u \cos \theta$$

$u_x =$ निरन्तर (Constant)

$$a_x = 0$$

वेग का अन्तर्वासर चरक

(y -अक्ष में गति)


$$u_y = u \sin \theta$$

$u_y =$ परिवर्ती (Variable)

$$a_y = -g$$

प्रक्षेप्य गति में निम्न variables को ज्ञात किया जाता है?

उदाहरण



- i) उड़ुयन डाल (Time of flight)
 (ii) अधिकतम ऊँचाई (~~Maximum Height~~) Height
 (iii) क्षैतिज परास (R) (Horizontal Range.)

उड़ुयन डाल (Time of flight) = ∞ प्रक्षेप्य गति के दौरान प्रक्षेप्य को पुनः जमीन पर पहुँचने में जितना समय लगता है, उसे प्रक्षेप्य का उड़ुयन डाल कहते हैं। इसे T से प्रदर्शित करते हैं।

$$T = \frac{2u \sin \theta}{g}$$

अधोपर गति लेने पर
 (y-अक्ष में गति)

$$S_y = 0$$

$$u_y = u \sin \theta$$

$$a_y = -g$$

$$t = T$$

गति के समीकरणों से

$$S = ut + \frac{1}{2}at^2$$

$$0 = u \sin \theta \cdot T + \frac{1}{2}(-g)T^2$$


$$0 = u \sin \theta \cdot T - \frac{g}{2} T^2$$

$$\frac{g}{2} T^2 = u \sin \theta \cdot T$$

$$T = \frac{2u \sin \theta}{g}$$

1) अधिकतम ऊँचाई (Maximum height) $\Rightarrow$ प्रक्षेप्य गति के दौरान प्रक्षेपक द्वारा अद्विचरित जितनी अधिक दूरी तय की जाती है, उसे प्रक्षेपक की अधिकतम ऊँचाई कहते हैं, इसे H_{max} से वर्णित करते हैं।

$$H_{max} = \frac{u^2 \sin^2 \theta}{2g}$$



अद्विचरित गति लेने पर
(y -अक्ष में गति)

$$v_y = 0$$

$$u_y = u \sin \theta$$

$$a_y = -g$$

$$s_y = H_{max}$$

तब गति के समी. से

$$v^2 = u^2 + 2as$$

$$0^2 = (u \sin \theta)^2 + 2(-g)H_{max}$$

$$0 = u^2 \sin^2 \theta - 2gH_{max}$$

$$2gH_{max} = u^2 \sin^2 \theta$$

$$H_{max} = \frac{u^2 \sin^2 \theta}{2g}$$

(iii) क्षैतिज परास $\Rightarrow$

(Horizontal Range) क्षैतिज गति करते हुए पिण्ड द्वारा क्षैतिज में जितनी दूरी तय की जाती है उसे पिण्ड का क्षैतिज परास कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं।

$$R = \frac{u^2 \sin 2\theta}{g} = \frac{u^2 2 \sin \theta \cos \theta}{g}$$

क्षैतिज दिशा में गति लेने पर :-
(वे-अक्ष में दिशा)

$$u_x = u \cos \theta$$

$$S_x = R$$


$$v_x = 0$$

$$t = T = \frac{2u \sin \theta}{g}$$

गति के सभी वे

$$S = ut + \frac{1}{2}at^2$$

$$R = u \cos \theta \times \frac{2u \sin \theta}{g} \times \frac{1}{2} \times 0 \times \left(\frac{2u \sin \theta}{g} \right)^2$$



$$R = \frac{u^2 \sin \theta \cos \theta}{g} + 0$$

$$R = \frac{u^2 (2 \sin \theta \cos \theta)}{g}$$

$$[\because 2 \sin \theta \cos \theta = \sin 2\theta]$$

$$R = \frac{u^2 \sin 2\theta}{g}$$

* अधिकतम क्षैतिज परास के लिए प्रतिबंध $\Rightarrow$ किसी पिण्ड की प्रक्षेप्य गति के दौरान अधिकतम क्षैतिज परास दिलाने के लिए θ का मान 45° होना चाहिए।

अर्थात्

$$\theta = 45^\circ$$

$$R = \frac{u^2 \sin 2\theta}{g}$$

$$R_{\max} = \frac{u^2}{g}$$

$$[\because \sin 90^\circ = 1]$$

$$R_{\max} = \frac{u^2 \sin (2 \times 45)}{g}$$

$$= \frac{u^2 \sin 90}{g}$$

~~दत्त दिग्वि~~

$$\theta = 30^\circ$$

$$u = 28 \text{ m/s}$$

$$\underline{\underline{(a) \quad H_{\text{max}} = \frac{v^2 \sin^2 \phi}{2g}}}$$

$\therefore g = 9.8 \text{ m/s}^2$

$$H = \frac{28 \times 28 \times \sin 30^\circ \times \sin 30^\circ \times 10}{2 \times 9.8}$$

$$H = 4 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times 10$$

$$H = 10 \text{ मीटर}$$

$$(b) \quad T = \frac{24 \sin \theta}{g}$$

$$T = \frac{2 \times 28 \times \sin 30^\circ \times 10}{2.8}$$

उदा.
 3.8. सैतिज से ऊपर की ओर 30° का कोण बनाते हुए एक फ्लिकर
 (1) गेंद 28 m/s की गति से फेंकी जाती है। (a) अधिकतम ऊँचाई
 की गणना कीजिए। (b) उसी स्तर पर वापस पहुँचने में लगे
 समय की गणना कीजिए, तथा (c) फेंकने वाले बिंदु से उस
 बिंदु की दूरी जहाँ गेंद उसी स्तर पर पहुँची है, की गणना कीजिए।

हल दिया है

$$\theta = 30^\circ$$

$$u = 28 \text{ m/s}$$

$$(a) H_{\text{max}} = \frac{u^2 \sin^2 \theta}{2g}$$

$$[-: g = 9.8 \text{ m/s}^2]$$

$$H = \frac{28 \times 28 \times \sin 30^\circ \times \sin 30^\circ \times 10}{2 \times 9.8}$$

$$H = 4 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times 10$$

$$H = 10 \text{ मीटर}$$

$$(b) T = \frac{2u \sin \theta}{g}$$

$$T = \frac{2 \times 28 \times \sin 30^\circ \times 10}{9.8}$$

$$T = \frac{4 \times \frac{1}{2} \times \frac{10}{2}}{7}$$

$$T = \frac{20}{7} = 2.8 \text{ sec}$$

(C) $R = \frac{u^2 \sin 2\theta \cos \theta}{g}$

$$R = \frac{28 \times 28 \times 2 \times \sin 30^\circ \times \cos 30^\circ}{9.8} \times 10$$

$$= 2 \times 4 \times 2 \times \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times 10$$

$$\boxed{R = 40\sqrt{3} \text{ मीटर}}$$

(d) अधिकतम क्षैतिज परास

$$R_{\text{max}} = \frac{u^2}{g}$$

$$= \frac{28 \times 28 \times 10}{9.8}$$

$$= 2 \times 4 \times 10$$

$$\boxed{= 80 \text{ मीटर}}$$

- Ques 3.7 एक पर्वत यात्री डिस्को स्विट्ज़रलैंड के डोने पर स्विट्ज़रलैंड चट्टान जमीन से 490 m ऊँची है, वहाँ एक पत्थर को क्षैतिज दिशा में 15 m/s की आरंभिक चाल से फेंकता है। वायु के प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए यह ज्ञात कि पत्थर को जमीन तक पहुँचने में कितना समय लगेगा तथा जमीन से टकराने समय उसकी चाल कितनी थी? ($g = 9.8\text{ m/s}^2$)

Ans

1] जमीन तक पहुँचने में लगा समय

अवधि गति लेने पर

$$s_y = -490 \text{ मी. (य-अक्ष की दिशा में)}$$

$$u_y = 0$$


$$a_y = 9.8 \text{ m/s}^2$$

$$t = ?$$

$$s = ut + \frac{1}{2} at^2$$

$$-490 = 0 + \frac{1}{2} (-9.8) t^2$$

$$-490 = \frac{-9.8}{2} t^2$$



$$10 = \frac{t^2}{10}$$

$$t^2 = 10 \times 10$$

$$t = \sqrt{10 \times 10}$$

$$\boxed{t = 10 \text{ sec}}$$

ii) जमीन से टकराते समय वस्तु का वेग :

अध्वनि गति लेने पर
(यू - अक्ष की दिशा में)

$$u_y = 0$$

$$v_y = ?$$

$$t = 10 \text{ sec}$$

$$a = -9.8 \text{ m/s}^2$$

$$v = u + at$$

$$v = 0 + (-9.8) \times 10$$

$$\boxed{v = -98 \text{ m/s}}$$

तब परिणामी वेग।

$$|v| = \sqrt{15^2 + 98^2}$$

$$= 99 \text{ m/s}$$

Ques घूर्णीय गति = ?

Date: _____

Page no: _____

Ques एक समान घुमाकार गति = ?

(Uniform Circular motion) जब कोई वस्तु किसी चाल से गति करती है, तो उसे वस्तु की एकसमान घूर्णीय गति कहते हैं। घूर्णीय गति समतल में गति का एक उदाहरण है।

i) आवर्तकाल (Time period) = ?

$$\text{सूत्र } T = \frac{2\pi r}{v}$$

जो एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगाता है, उसे वस्तु का आवर्तकाल कहते हैं। इसे बड़ी T से प्रदर्शित करते हैं। इसका मापक सेकंड है।

ii) आवृत्ति (Frequency) = ?

$$T = \text{समय} / \text{चक्करो की संख्या}$$

एक सेकंड में लगाए गए चक्करो की संख्या को वस्तु की आवृत्ति कहते हैं। इसे f या ν (न्यू) से प्रदर्शित करते हैं एवं इसका मापक s^{-1} या Hz (हर्ट्ज) है।


iii) आवर्तकाल एवं आवृत्ति में संबंध = ?

$$T = \frac{1}{f}$$

$$\text{या } f = \frac{1}{T} \text{ या } f \cdot T = 1$$

कोणीय विस्थापन $\Rightarrow$

जब कोई ठोस घूर्णाकार मार्ग पर गति करता है तो केन्द्र पर उसके द्वारा बनाए गए कोण को कोणीय विस्थापन कहते हैं। इसे θ से प्रदर्शित करते हैं।



$$\text{कोण} = \frac{\text{चाप}}{\text{त्रिज्या}}$$

$$\theta = \frac{s}{r}$$

S.I मात्रक $\div$ Radian (अं०)

विमीय सूत्र $\div$ यह एक विमहीन राशी है।

प्रकृति $\div$ यह एक सदिश राशी है एवं यह एक अक्षीय सदिश है और इसकी दिशा सीधे दाथ के अंगूठे के नियम से ज्ञात की जा सकती है।

कोणीय विस्थापन एवं रेखीय विस्थापन में संबंध $\div$

कोणीय विस्थापन की परिभाषा है $\div$

$$\theta = \frac{s}{r}$$

$\Delta = \theta$ → कोणीय विस्थापन

↓
इरिक्त
विस्थापन

↓
मिथ्या

कोणीय वेग ⇒ कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। इसे ω या $\frac{d\theta}{dt}$ से प्रदर्शित है।

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}$$

अन्य सूत्र:

$$\text{कोणीय वेग} = \frac{\text{कोणीय विस्थापन}}{\text{आवर्तकाल}}$$


$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

आवृत्ति के पद में:

$$f = \frac{1}{T}$$

$$\omega = 2\pi \times \frac{1}{T}$$

$$\omega = 2\pi f$$



मापके :- Rad/sec

विमीयसूत्र :- $[M^0 L^0 T^{-1}]$

प्रकृति :- यह एक स्पर्शिक घूर्णन है। एवं यह एक अक्षीय घूर्णन है।
और इसकी दिशा सीधे हाथ के अंगुठे के नियम से ज्ञात की जा सकती है।

* रेखिक वेग एवं कोणीय वेग में संबंध :-

कोणीय विस्थापन

$$\theta = \frac{s}{r}$$

एवं कोणीय वेग की परिभाषा है :

$$\omega = \frac{\theta}{t}$$

θ के मान की रखने पर :-

$$\omega = \frac{s}{r \cdot t}$$

$$\omega = \frac{1}{r} \left(\frac{s}{t} \right) \quad \frac{1}{r} \times \frac{s}{t}$$

$$\left[\therefore \frac{s}{t} = v \right]$$

$$\omega = \frac{1}{r} \times v$$

$$v = r\omega$$

यही आवश्यक संबंध है।

* कोणीय त्वरण $\Rightarrow$ कोणीय विस्थापन में परिवर्तन के दर को कोणीय त्वरण कहते हैं।

$$\alpha = \frac{\text{कोणीय वेग}}{\text{समय}}$$

$$\alpha = \frac{\omega}{t}$$

$$\text{मात्रक} = \frac{\text{Rad/sec}}{\text{sec}}$$

$$= \text{Rad/sec}^2$$

$$\text{विमीय सूत्र} = [M^0 L^0 T^{-2}]$$

यह एक सदिश राशि है एवं अक्षीय सदिश है एवं इसकी दिशा (संभावित) घूर्णन के अंगुष्ठ के नियम से निर्धारित होती है।

रेखिक त्वरण एवं औणीय त्वरण में संबंध :-

औणीय त्वरण की परिभाषा से :

$$\alpha = \frac{\omega}{t}$$

$$[\because v = r\omega]$$

$$\omega = \frac{v}{r}$$

$$\text{तब } \alpha = \frac{v}{rt}$$

$$r\alpha = \left(\frac{v}{t}\right)$$


$$[\because a = \frac{v}{t}]$$

$$r\alpha = a$$

$$\text{या } \boxed{a = r\alpha}$$

* अभिकेन्द्रीय त्वरण =)

जब कोई कण एक समान वृत्तीय गति कर रहा होता है तब प्रत्येक क्षण पर उस कण के वेग की दिशा परिवर्तित होती रहती है। एवं इस प्रकार वेग में परिवर्तन होता है। वृत्तीय गति में वेग में परिवर्तन होने के कारण एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है। जिसकी दिशा वृत्त के केन्द्र की ओर होती है। इसलिए इस त्वरण को अभिकेन्द्रीय त्वरण कहते हैं।



वेग वृत्तीय गति

वेग में परिवर्तन

$$a_c = \frac{v^2}{R}$$

$$a_c = \omega^2 R$$

अभिकेन्द्रीय त्वरण

$$a_c = \frac{v^2}{R}$$

$$\therefore v = \omega R$$

Q.9 एक छोटी कीड़ा एक वृत्तीय खोंचे में जिसकी त्रिज्या 12 cm है, घूम रहा है। वह खोंचे के 7 अनुदिश स्थिर चाल से चलता है और 100 सेकण्ड में 7 चक्कर लगा देता है। (a) कीड़े की कोणीय चाल व रेखीय चाल कितनी होगी? (b) क्या त्वरण सदिश एक अक्षर सदिश है। इसका परिणाम कितना होगा?

दिया है

$$r = 12 \text{ cm}$$

$$t = 100 \text{ sec}$$

$$\text{Rounds} = 7$$

तब आवर्तकाल

$$T = \frac{\text{समय}}{\text{चक्करों की संख्या}} = \frac{100}{7}$$

तब कोणीय चाल

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \quad \omega = \frac{2\pi}{\frac{100}{7}}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$\omega = \frac{2 \times 22}{7 \times 100}$$

$$= \frac{44}{100} = 0.44 \text{ Rad/sec}$$

रेल्वे चाल

$$v = r\omega$$

$$v = \frac{12}{100} \times 0.44$$

$$v = \frac{5.28}{100}$$

$$v = 0.0528 \text{ m/s}$$

(B) अभिकेन्द्रीय त्वरण :-

$$a_c = r\omega^2$$

$$= \frac{12}{100} \times 0.44 \times 0.44$$


$$= 0.023232$$

$$= 0.023 \text{ m/s}^2$$

Q.3.8 एक पथ पर तीन लड़कियाँ 200 m लम्बा वाली पृथ्वी की सतह पर स्केटिंग कर रही हैं। वे सतह के किनारे के बिंदु p से स्केटिंग शुरू करती हैं तथा p के स्थानीय व्यासीय विपरित बिंदु q पर विभिन्न पथों से होकर पहुँचती हैं जैसा कि चित्र 3.11 में दिखाया गया है। प्रत्येक लड़की के विस्थापन सदिश का परिमाण कितना है? किस लड़की के लिए यह पारत्व में स्केटिंग के पथ की संख्या के बराबर है।

Ans दिया है

$$r = 200 \text{ m}$$



तब यदि तीनों साइकिल बिंदु
A से B पर पहुँचती हैं तो
उनका विस्थापन वृत्त के व्यास
के बराबर होगा अर्थात्:

$$\begin{aligned} \text{विस्थापन बराबर} &= 2r \\ &= 2 \times 200 \\ &= 400 \text{ m} \end{aligned}$$

एवं लकड़ी की पथ की लम्बाई उनके विस्थापन के बराबर
होगी।

Ex 3.9 कोई साइकिल सवार किसी वृत्तीय पार्क के केंद्र से
चलना शुरू करता है तथा पार्क के किनारे P पर पहुँचता
है। पुनः वह पार्क की परिधि के अनुदिश साइकिल
चलाता हुआ 90° के एंगल (जैसा चित्र 3.20) में दिखाया गया है
केंद्र पर वापस आ जाता है। पार्क की त्रिज्या 1 km है।
यदि पूरे चक्कर में मिनट लगते हों तो साइकिल
सवार का (a) कुल विस्थापन (b) औसत वेग तथा (c) औसत
गति क्या होगा ?

Ans (a) कुल विस्थापन

$$S = 0$$

(b) औसत वेग

$$\text{वेग} = \frac{\text{कुल विस्थापन}}{\text{कुल समय}}$$

$$= \frac{0}{10} = 0$$

(c) औसत चाल :

$$\text{औसत चाल} = \frac{\text{कुल दूरी}}{\text{कुल समय}}$$

$$= \frac{1 + \frac{1}{2} (200) + 1}{\frac{10}{60}}$$

$$= \frac{2 + \left(\frac{1}{2} \times 3.14 \times 1 \right)}{\frac{1}{6}}$$

$$= \frac{4 + 3.14}{\frac{1}{6}}$$


$$= 7.14 \times 3$$

$$= 21.42 \text{ km/h}$$

सिद्ध किजिए की त्वरित गति कर रहे कण का मार्ग परवलयिक होता है। Date: _____ Page no: _____

त्वरित गति कर रहे वस्तु के मार्ग का समीकरण क्या लिखिए ?

माना की कोई वस्तु t समय पर मार्ग के किसी बिन्दु P पर पहुँच जाता है। तब वह क्षितिज में x दूरी चलता है तथा ऊर्ध्वाधर y दूरी तय करता है।



क्षितिज में गति करने पर
(x -अक्ष के अनुदिश)

$$u_x = u \cos \theta$$

$$a_x = 0$$

$$S_x = x$$

$$t = t$$

$$\text{NB } S = ut + \frac{1}{2} at^2$$

$$x = u \cos \theta t + 0$$

$$t = \frac{x}{u \cos \theta}$$

अध्याय गति लेने पर

(य - अक्ष के अनुदिश)

$$u_y = u \sin \theta$$

$$a_y = -g$$

$$S_y = y$$

$$t = t$$

$$\text{NB } S = ut + \frac{1}{2} at^2$$

$$y = u \sin \theta t + \frac{1}{2} (-g) t^2$$

सभी (i) से t का मान रखने पर

$$y = u \sin \theta \left(\frac{x}{u \cos \theta} \right) - \frac{g}{2} \left(\frac{x}{u \cos \theta} \right)^2$$

अपरोक्त समीकरण एक परवलय का समीकरण है जो हमें बताता है कि सदिश का पथ परवलयीय होगा

$$y = x \tan \theta - \frac{g}{2v^2 \cos^2 \theta} x^2$$

$$y = x \tan \theta - \frac{g}{2v^2 \cos^2 \theta} x^2$$

सदिशों के अदिश गुणन के कई दो गुण दिए जा रहे हैं

सदिशों के अदिश गुणन :

i) यदि दो समान एकांक सदिशों का अदिश गुणन किया जाए तो उसका परिमाण एक होता है और यदि दो अलग-अलग एकांक सदिशों का अदिश गुणन किया जाए तो उसका मान शून्य होता है।

$$\hat{i} \cdot \hat{i} = 1$$

$$\hat{j} \cdot \hat{j} = 0$$

ii) दो सदिश एक-दूसरे के लम्बवत् होंगे यदि उनका अदिश गुणन शून्य हो।

iii) सदिशों का अदिश गुणन क्रमविनिमय नियम का पालन करता है।

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = \vec{B} \cdot \vec{A}$$

Ques दो सदिशों के सदिश गुण के गुण लिखिए।

Ans सदिशों के सदिश गुण :-

i) दो समान ~~एक~~ सदिशों का सदिश गुण (0) शून्य होता है।

$$\vec{a} \times \vec{a} = 0, \quad \vec{b} \times \vec{b} = 0$$

ii) दो ~~समान~~ सदिश समान्तर होंगे यदि उनका सदिश गुण (0) शून्य हो।

Ques क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 m की अधिकतम दूरी में सीधा दूरी तक उसी गेंद को सकता है। वह खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से कितनी ऊपर तक फेंक सकता है?

Ans दिया है :-

$$R_{max} = 100 \text{ m}$$

$$\frac{u^2}{g} = 100$$

$$u^2 = 100g$$

$$v^2 = u^2 + 2as$$

$$0 = 100g + 2(-g)H$$

$$2gH = \frac{100g}{s}$$

$$H = 50 \text{ m}$$

Ques यदि $\vec{A} = 3\hat{i} + 4\hat{j} - 5\hat{k}$ एवं $\vec{B} = 2\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k}$

हो तो (i) $\vec{A} \cdot \vec{B}$ (ii) $\vec{A} \times \vec{B}$ (iii) $\vec{A}$ व $\vec{B}$ के

बीच का कोण ज्ञात करें

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 3 & 4 & -5 \\ 2 & 3 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} \vec{A} \cdot \vec{B} &= (3\hat{i} + 4\hat{j} - 5\hat{k}) \cdot (2\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k}) \\ &= 6 + 12 + 5 \\ &= 23 \end{aligned}$$

$$(ii) \vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 3 & 4 & -5 \\ 2 & 3 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 &= +\hat{i}(-4+15) - \hat{j}(-3+10) + \hat{k}(9-8) \\
 &= \hat{i}(11) - \hat{j}(7) + \hat{k}(1) \\
 &= 11\hat{i} - 7\hat{j} + \hat{k}
 \end{aligned}$$

(iii) हम जानते हैं कि $\vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}| |\vec{B}| \cos \theta$

$$\cos \theta = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{|\vec{A}| |\vec{B}|}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(3\hat{i} + 4\hat{j} - 5\hat{k}) \cdot (2\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k})}{\sqrt{3^2 + 4^2 + (-5)^2} \sqrt{2^2 + 3^2 + (-1)^2}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{6 + 12 + 5}{\sqrt{9+16+25} \sqrt{4+9+1}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{23}{\sqrt{50} \sqrt{14}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{23}{5\sqrt{2} \sqrt{14}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{23}{5\sqrt{28}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{23}{5 \times 2\sqrt{7}}
 \end{aligned}$$

$$\cos \theta = \frac{23}{10\sqrt{7}}$$

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{23}{10\sqrt{7}} \right) \text{ Ans}$$