

विलयन• विलयन

"विलयन दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, जिसका संगठन कुछ सीमाओं तक परिवर्तित किया जा सकता है।"
 उदा० - जल में थोड़ी चीनी डालकर उसे हिलाने पर चीनी जल में अदृश्य हो जाती है अर्थात् विलीन हो जाती है।

विलयन को बनाने वाले पदार्थ विलयन के "घटक" कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं -

- (i) विलेय
- (ii) विलायक

(i) विलेय $\Rightarrow$

विलेय विलयन का वह घटक है, जो अन्य मात्रा में उपस्थित होता है अथवा वह पदार्थ जो विलयन में विपरीत हो जाता है।

(ii) विलायक $\Rightarrow$

विलायक विलयन का वह घटक है, जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है अथवा वह घटक जिसमें विलेय के कण विपरीत होते हैं।

नोट :-

जल में बनायीं गए विलयन 'जलीय विलय' [aqueous solution]

कहलाते हैं, जबकि अन्य द्रव में बनने वाले विलयन 'अजलीय विलयन' कहलाते हैं।

• विलयनों के प्रकार —

विलेय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों के नौ प्रकार होते हैं—

विलयन का प्रकार	विलेय	विलायक	उदाहरण
(i) गैसीय विलयन	गैस	गैस	वायु (नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन का मिश्रण)
	द्रव	गैस	क्लोरोफॉर्म (मद्य) को नाइट्रोजन गैस में मिश्रित किया जाता है।
	ठोस	गैस	कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन
(ii) द्रव विलयन	गैस	द्रव	जल में घुली ऑक्सीजन
	द्रव	द्रव	जल में घुली ऐथेनॉल C_2H_5OH
	ठोस	द्रव	जल में घुला ग्लूकोज
(iii) ठोस विलयन	गैस	ठोस	हाइड्रोजन का पेंटेडियम में विलयन
	द्रव	ठोस	पारे का सोडियम के साथ अमलगम
	ठोस	ठोस	ताँबे का सोन में विलयन

- सांद्रता के आधार पर विलयन पाँच प्रकार के होते हैं:-

① तनु विलयन [Dilute solution] :-

ऐसे विलयन, जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है, व विलयन "तनु विलयन" कहलाते हैं।

② सांद्र विलयन [Concentrated solution] :-

ऐसे विलयन, जिनमें विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत ज्यादा होती है, व विलयन "सांद्र विलयन" कहलाते हैं।

③ संतृप्त विलयन [Saturated solution] :-

वह विलयन, जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घली जा सकती "संतृप्त विलयन" कहलाती है।

इसमें विलेय तथा विलायक के बीच साम्य होता है।

उदा- 36g. NaCl की 100g. जल में घोलने पर 20°C ताप पर एक संतृप्त विलयन बनता है।

④ असंतृप्त विलयन [Unsaturated solution] :-

वह विलयन,

जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा घोलनी जा सकती है, "असंतृप्त विलयन" कहलाता है। तबु एवं सांद्र विलयन 'असंतृप्त विलयन' होते हैं।

③ असंतृप्त विलयन [unsaturated solution] :-

वह विलयन, जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है, "असंतृप्त विलयन" कहलाता है।

यह स्थिति विलयन को तेजी से ठंडा करने पर आती है। संतृप्त

• विलयन की सांद्रता $\Rightarrow$

विलेय की वह मात्रा, जो दिए गए विलयन में उपस्थित होती है, वह विलयन की "सांद्रता" कहलाती है।

• विलयन का सांद्रण [सांद्रता] को व्यक्त करने की विधियाँ :-

① द्रव्यमान प्रतिशत $\Rightarrow$

किसी विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत द्रव्यमान के अनुसार विलेय के भागों की वह संख्या, जो द्रव्यमान के अनुसार विलयन के 100 भागों में उपस्थित (विलेय) रहते हैं।

उदा० - यदि 5g. शर्करा लेकर 100g. का विलयन बनाया जाए, तो उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत 5 होगा। द्रव्यमान प्रतिशत को w/w से दर्शाते हैं।

यदि W_A और W_B क्रमशः द्रव्य A और B के द्रव्यमान हों तो

$$\text{द्रव्यमान \%} = \frac{\text{विलय का द्रव्यमान}}{\text{विलयन का द्रव्यमान}} \times 100$$

$$A \text{ का द्रव्यमान \%} = \frac{W_A}{W_A + W_B} \times 100$$

② आयतन प्रतिशत $\Rightarrow$

किसी विलयन का आयतन प्रतिशत आयतन के अनुसार विलय के भागों की वह संख्या है, जो विलयन के 100 भागों में विलय रहती है।

यदि V_A और V_B क्रमशः द्रव्य A और B के आयतन हों तो

$$\text{आयतन \%} = \frac{\text{विलय का आयतन}}{\text{विलयन का आयतन}} \times 100$$

$$\text{द्रव्य A का आयतन \%} = \frac{V_A}{V_A + V_B} \times 100$$

आयतन प्रतिशत को V/V से दर्शाते हैं।

③ द्रव्यमान आयतन प्रतिशत $\Rightarrow$

द्रव्यमान आयतन प्रतिशत द्रव्यमान के अनुसार विलय के भागों की वह संख्या जो 100 ml. विलयन में उपस्थित होता है।

इसकी स्काई W/V होती है। इस विधि का प्रयोग औषधियाँ बनाने में किया जाता है।

★ मोलरता 'M' ⇒

इसे 'M' द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। "किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की अथवा ग्राम अणुओं की संख्या, 'मोलरता' कहलाती है।"

$$\text{मोलरता 'M'} = \frac{\text{विलेय के मोलों की संख्या}}{\text{विलयन का 1 लीटर में आयतन}}$$

$$M = \frac{\text{विलेय के मोलों की संख्या}}{\text{विलयन का ml. में आयतन}} \times 100$$

$$1L = 1000 \text{ ml} = 1000 \text{ cm}^3 = 1 \text{ dm}^3$$

$$\boxed{\begin{array}{l} 1L = 1 \text{ dm}^3 \\ 1 \text{ ml} = 1 \text{ cm}^3 \end{array}}$$

यदि n_B विलेय के मोलों की संख्या V विलयन की मिली लीटर में आयतन हो तो

$$\text{मोलरता (M)} = \frac{n_B}{V_{ml}} \times 1000 \quad n_B = \frac{W_B}{M_B}$$

$$\text{मोलरता (M)} = \frac{W_B}{M_B \times V_{ml}} \times 1000$$

$$M = \frac{\text{विलेय का द्रव्यमान} \times 1000}{\text{विलेय का अणुविक द्रव्यमान} \times \text{विलयन का आयतन}}$$

$$n_B = \frac{\text{विलेय का द्रव्यमान}}{\text{विलेय का आणविक द्रव्यमान}} = \frac{W_B}{M_B}$$

Note:-

- (i) मोलरता ताप पर निर्भर करती है, क्योंकि ताप में परिवर्तन से आयतन में परिवर्तन होता है।
- (ii) यदि किसी विलेय का 1g. मोल 1 लीटर विलयन में उपस्थित हो तो उस विलयन की मोलरता 1M होगी।

मोलरता की इकाई मोल / लीटर होती है।

⑤ मोललता $\Rightarrow$

इसे 'm' द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।
"किसी विलयन की मोललता प्रति 1000g. या 1K.g. विलायक में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या की मोललता कहते हैं।"

मोललता 'm' = $\frac{\text{विलेय के मोलों की संख्या}}{\text{विलायक का द्रव्यमान (1K.g.)}}$

$$'m' = \frac{\text{विलेय के मोलों की संख्या}}{\text{विलायक का द्रव्यमान (ग्राम)}} \times 1000$$

यदि विलेय के n_B मोल W_A ग्राम विलायक में विलेय होँती

$$'m' = \frac{n_B}{W_A} \times 1000$$

$$n_B = \frac{W_B}{M_B}$$

$$\left(\frac{\text{विलेय का द्रव्यमान}}{\text{विलेय का आणविक द्रव्यमान}} \right)$$

$$m = \frac{W_b}{M_b \times W_A} \times 1000$$

Note :-

यदि किसी विलय पदार्थ का 1g. मौल प्रति किलोग्राम या 1000 g. विलायक में विलय या उपस्थित हो, तो उस विलयन की मौलता 1m. होगी।

मौलता ताप से परिवर्तित नहीं होती।

मौलता तथा मौलता में अंतर

मौलता	मौलता
(i) मौलता का संबंध विलयन के आयतन से होता है।	मौलता का संबंध विलायक के द्रव्यमान से होता है।
(ii) मौलता ताप क्रम परिवर्तन से परिवर्तित हो जाती है।	मौलता ताप क्रम परिवर्तन से परिवर्तित नहीं होती।
(iii) मौलता में विलायक के द्रव्यमान की मात्रा महत्वहीन है।	मौलता में विलयन का आयतन महत्वहीन होता है।
(iv) इसकी इकाई मोल / लीटर होती है।	इसकी इकाई मोल / किग्रा. होती है।

⑥ मोल प्रभाज / अंश :-

"मोल प्रभाज किसी 1 घटक (विलेय या विलायक) के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात है।"
जैसे इसी प्रदर्शित करते हैं।

मान लो किसी विलयन में दो घटक A और B हैं, तो

	A	B	
मोल	n_A	n_B	$(n_A = \frac{W_A}{M_A})$

मोल प्रभाज	x_A	x_B	$(x_B = \frac{W_B}{M_B})$
------------	-------	-------	---------------------------

मोल प्रभाज	$A (x_A) = \frac{n_A}{n_A + n_B}$
------------	-----------------------------------

मोल प्रभाज	$B (x_B) = \frac{n_B}{n_A + n_B}$
------------	-----------------------------------

Note:-

यदि हमें एक घटक का मोल प्रभाज ज्ञात हो, तो दूसरे घटक के मोल प्रभाज की गणना की जा सकती है। मोल प्रभाज का योग हमेशा 1 के बराबर होगा।

$$[x_A + x_B + \dots = 1]$$

⑦ पार्ट्स प्रति मिलियन (PPM) $\Rightarrow$

यह इकाई तब उपयोग में लाई जाती है, जब विलयन में विलेय की मात्रा बहुत कम होती है। "किसी विलयन के 10^6 भाग (भाग) भाग में विलेय के भाग भागों की संख्या विलयन की पार्ट्स प्रति मिलियन में सांद्रता कहलाती है।" इसे PPM से प्रदर्शित करते हैं।

$$\text{पार्ट्स प्रति मिलियन} = \frac{\text{विलेय का द्रव्यमान}}{\text{विलयन का द्रव्यमान}} \times 10^6$$

Note :-

वायुमंडलीय प्रदूषण को PPM द्वारा व्यक्त किया जाता है।

⑧ नार्मलिता $\Rightarrow$

"किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के तुल्यांक या ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की 'नार्मलिता' कहलाती है।" इसे 'N' से प्रदर्शित करते हैं।

$$\text{नार्मलिता 'N'} = \frac{\text{विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या}}{\text{विलयन का आयतन}} \times 1000$$

$$\text{ग्राम तुल्यांक} = \frac{\text{विलेय का द्रव्यमान (ग्राम)}}{\text{तुल्यांकी द्रव्यमान}}$$

$$\text{तुल्यांकी द्रव्यमान} = \frac{\text{विलेय का आणविक द्रव्यमान}}{n - \text{तुल्यांक}}$$

$$N = \frac{\text{विलेय का द्रव्यमान} \times 1000}{\text{विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान} \times \text{विलयन का आयतन}}$$

$$N = \frac{W_B}{E_B \times V_{ml}} \times 1000 \quad \left[\text{इकाई} = \frac{\text{ग्राम तुल्यांक}}{\text{लीटर}} \right]$$

द्रव्यमान प्रतिशत

Ques: 40 g. सल्फ्यूरिक अम्ल (H_2SO_4) 100 m.l. विलयन में उपस्थित है, तो विलयन में सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रतिशत की गणना कीजिए।

Ans: दिया है —

$$\text{विलेय का द्रव्यमान} = 40 \text{ g.}$$

$$\text{विलयन का द्रव्यमान} = 100 \text{ g.}$$

$$\text{द्रव्यमान प्रतिशत} = ?$$

$$\text{द्रव्यमान \%} = \frac{\text{विलेय का द्रव्यमान}}{\text{विलयन का द्रव्यमान}} \times 100$$

$$= \frac{40}{100} \times 100$$

$$= 40 \% \text{ W/W}$$

Ques: 30 g. ग्लूकोज $[C_6H_{12}O_6]$ 370 g. विलायक में उपस्थित है, तो विलयन में ग्लूकोज के प्रतिशत की गणना कीजिए।

दिया है —

Ans: $\text{विलेय का द्रव्यमान} = 30 \text{ g.}$

$$\text{विलायक का द्रव्यमान} = 370 \text{ g.}$$

$$\text{विलयन का द्रव्यमान} = \text{विलेय का द्रव्यमान} + \text{विलायक का द्रव्यमान}$$

$$= 30 + 370$$

$$= 400 \text{ g.}$$

$$\text{द्रव्यमान \%} = \frac{\text{विलेय का द्रव्यमान}}{\text{विलयन का द्रव्यमान}} \times 100$$

$$= \frac{30}{400} \times 100$$

$$= \frac{15}{2}$$

$$= 7.5 \% \text{ W/W}$$

NCERT

Ques:

22g. बेंजिन को 122g. कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोलने पर बेंजिन के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए।

Soln:

दिया है —

$$\text{विलेय का द्रव्यमान} = 22\text{g.}$$

$$\text{विलायक का द्रव्यमान} = 122\text{g.}$$

$$\text{विलयन का द्रव्यमान} = \text{विलेय का द्रव्यमान} + \text{विलायक का द्रव्यमान}$$

$$= 22 + 122$$

$$= 144\text{g.}$$

$$\text{द्रव्यमान प्रतिशत} = \frac{\text{विलेय का द्रव्यमान}}{\text{विलयन का द्रव्यमान}} \times 100$$

$$= \frac{22}{144} \times 100$$

$$= \frac{11}{72} \times 100$$

$$= \frac{1100}{72}$$

$$= \frac{550}{36}$$

$$= \frac{275}{18}$$

$$= 15.27\% \text{ W/W}$$

$$\begin{aligned} \text{कार्बन टैड क्लोराइड का द्रव्यमान \%} &= 100 - 15.25 \\ &= 84.73\% \end{aligned}$$

Ques: 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड (NaOH) के 200 g विलयन में NaOH की मात्रा की गणना कीजिए।

Ans: दिया है —

$$\begin{aligned} \text{द्रव्यमान \%} &= 10\% \\ \text{विलयन का द्रव्यमान} &= 200 \text{ g} \end{aligned}$$

$$\text{द्रव्यमान \%} = \frac{\text{विलय का द्रव्यमान}}{\text{विलयन का द्रव्यमान}} \times 100$$

$$10\% = \frac{\text{विलय का द्रव्यमान}}{200} \times 100$$

$$10 \times 2 = \text{विलय का द्रव्यमान}$$

$$\text{विलय का द्रव्यमान} = 20 \text{ g}$$

आयतन प्रतिशत

Ques: 30 mL ऐथिल ऐल्कोहॉल को 270 mL जल में घोलने पर ऐथिल ऐल्कोहॉल का आयतन % ज्ञात कीजिए।

Solve: दिया है -

$$\begin{aligned} \text{विलेय का आयतन} &= 30 \text{ ml.} \\ \text{विलायक का आयतन} &= 270 \text{ ml.} \\ \text{विलयन का आयतन} &= \text{विलेय का आयतन} + \text{विलायक का आयतन} \\ &= 30 \text{ ml} + 270 \text{ ml.} \\ &= 300 \text{ ml.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{आयतन \%} &= \frac{\text{विलेय का आयतन}}{\text{विलयन का आयतन}} \times 100 \\ &= \frac{30}{300} \times 100 \\ &= \frac{30}{3} \\ &= 10 \% \text{ V/V} \end{aligned}$$

मोलरता

Ques: ५९. सोडियम (NaOH) दारुद्रोवसारड को 250 ml. विलयन में दौला गया, विलयन की मोलरता ज्ञात करी (NaOH का आणविक द्रव्यमान = ५०g./m)

दिया है -

Solve:

$$\begin{aligned} \text{विलेय का द्रव्यमान } W_B &= 49. \\ \text{विलेय का आणविक द्रव्यमान } M_B &= 40 \text{ g.} \\ \text{विलयन का आयतन } V &= 250 \text{ ml.} \end{aligned}$$

$$\text{मोलरता} = \frac{W_B}{M_B \times V} \times 1000$$

$$= \frac{4}{40} \times \frac{1000}{250}$$

$$= \frac{4}{10}$$

$$= 0.4 \text{ M (मोल/लीटर)}$$

$$1 \text{ Kg} = 1000 \text{ g} = 10^6 \text{ mg} = 10^9 \text{ m.g.}$$

Ques: 5.85 ग्राम NaCl (सोडियम क्लोराइड) को 200 म.ल. विलयन में घाला गया है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। [NaCl का आणविक द्रव्यमान = 58.5g.]

Sol: विलय का द्रव्यमान = $W_B = 5.85 \text{ g}$.
 विलय का आणविक द्रव्यमान = $M_B = 58.5 \text{ g}$.
 विलयन का आयतन = $V = 200 \text{ m.l.}$

$$\begin{aligned} \text{मोलरता } M &= \frac{W_B}{M_B \times V} \times 1000 \\ &= \frac{5.85}{58.5 \times 200} \times 1000 \\ &= \frac{585 \times 5}{585 \times 10} \\ &= \frac{5}{10} \\ &= \frac{1}{2} \\ &= 0.5 \text{ M} \end{aligned}$$

NCERT

Ques:

2.46 g. (NaOH) सोडियम हाइड्रोक्साइड को 100 cm^3 विलयन में उपस्थित है तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए।

Soln:

विलेय का द्रव्यमान = 2.46 g.

विलेय का आणविक द्रव्यमान = 40 g.

विलयन का आयतन = 100 cm^3

$$\text{मोलरता } M = \frac{W_B}{M_B \times V} \times 1000$$

$$= \frac{2.46 \times 1000}{40 \times 100}$$

$$= \frac{2.46}{4}$$

$$= 0.615 \text{ Mol/L.}$$

मोललता

Ques:

500 g. घोल में 4 g. (NaOH) सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला है, तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए।

Soln:

विलेय का द्रव्यमान (W_B) = 4 g.

विलेय का आणविक द्रव्यमान (M_B) = 40 g.

विलायक का द्रव्यमान (W_A) = 500 g.

$$\text{मोललता } m = \frac{W_B}{M_B \times W_A} \times 1000$$

$$= \frac{4}{40 \times 500} \times 1000$$

$$= \frac{4}{20}$$

$$= 0.2 \text{ mol / k.g.}$$

NCERT

Ques:

2.5 g. ऐसीनॉइक अम्ल ($\text{C}_2\text{H}_3\text{COOH}$) को 75 g. बेंझिन में घोला है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए।

Soln:

$$\text{विलेय का द्रव्यमान (W}_B\text{)} = 2.5 \text{ g.}$$

$$\text{विलेय का आणविक द्रव्यमान (M}_B\text{)} = 60 \text{ g.}$$

$$\text{विलायक का द्रव्यमान (W}_A\text{)} = 75 \text{ g.}$$

$$m = \frac{W_B}{M_B \times W_A} \times 1000$$

$$= \frac{2.5 \times 1000}{60 \times 75}$$

$$= \frac{10}{18}$$

$$= \frac{5}{9}$$

$$= 0.55 \text{ mol / k.g.}$$

Ques:

शुद्ध जल की मोलरता एवं मोललता की गणना कीजिए।
(जल का घनत्व = 1 g / ml)

Soln:

$$\text{विलेय का द्रव्यमान} = 1000 \text{ g.}$$

$$\text{विलेय का आणविक द्रव्यमान} = 18 \text{ g.}$$

$$\text{विलयन का आयतन} = 1000 \text{ ml.}$$

$$\text{घनत्व} = 1 \text{ g./ml.}$$

$$\text{घनत्व} = \frac{\text{द्रव्यमान}}{\text{आयतन}}$$

$$1 = \frac{\text{द्रव्यमान}}{1000}$$

$$\text{द्रव्यमान} = 1000 \text{ g.}$$

$$\text{मोलरता } M = \frac{W_B}{M_B \times V} \times 1000$$

$$= \frac{1000 \times 1000}{18 \times 1000}$$

$$= \frac{1000}{18}$$

$$= 55.55 \text{ mol/l.}$$

Note: जल की मोलरता एवं मोललता 55.55 होती है।

मोल प्रभाज / अंश

Ques:

ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 10% w/w है, तो विलयन का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए।

Solur: 10% ग्लूकोज का मतलब 10g. ग्लूकोज 90g. जल में उपस्थित है।

ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान = 180 g.

जल का आणविक द्रव्यमान = 18 g.

ग्लूकोज का मोल ($n_{\text{ग्लूकोज}}$) = $\frac{10}{180} = 0.055$

जल का मोल ($n_{\text{जल}}$) = $\frac{90}{18} = 5$

ग्लूकोज का मोल (मोल) = $\frac{n_{\text{ग्लूकोज}}}{n_{\text{ग्लूकोज}} + n_{\text{जल}}}$

$$= \frac{0.055}{0.055 + 5}$$

$$= \frac{0.055}{5.055}$$

$$= 0.011$$

जल का मोल प्रभाव (मोल) = $1 - 0.011$

$$= 0.989$$

NCERT

Ques:

ऐथिलीन ग्लाइकोल ($C_2H_6O_2$) के मोल प्रभाव की गणना करें, यदि विलयन में ऐथिलीन ग्लाइकोल का 20% द्रव्यमान उपस्थित है।

Solur:

20% ऐथिलीन ग्लाइकोल का मतलब 20g. ऐथिलीन ग्लाइकोल 80g. विलायक (जल) में उपस्थित है।

$$\begin{aligned} \text{ऐथिलीन ग्लाइकोल का आणविक द्रव्यमान} &= 62 \text{ g.} \\ \text{जल का आणविक द्रव्यमान} &= 18 \text{ g.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ऐथिलीन ग्लाइकोल का मोल (n.E.G)} &= \frac{20}{62} \\ &= 0.322 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{जल का मोल (n.W)} &= \frac{80}{18} \\ &= 4.444 \end{aligned}$$

$$\text{ऐथिलीन ग्लाइकोल का मोल प्रभाज} \quad n.E.G = \frac{n.E.G}{n.E.G + n.W}$$

$$n.E.G = \frac{0.322}{0.322 + 4.444}$$

$$= \frac{0.322}{4.444}$$

$$= 0.068$$

$$\begin{aligned} \text{जल का मोल प्रभाज (n.W)} &= 1 - 0.068 \\ &= 0.932 \end{aligned}$$

पाइस प्रति मिलियन

Ques: 1000 g. विलयन में, 100 mg. कैल्शियम कार्बोनेट (CaCO_3) घुला है, तो विलयन की सांद्रता PPM में बता दीजिए।

Solve दिया है —

$$\begin{aligned} \text{विलेय का द्रव्यमान} &= 100 \text{ mg} = \frac{100}{1000} = 0.1 \text{ g} \\ \text{विलयन का द्रव्यमान} &= 1000 \text{ g} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPM} &= \frac{\text{विलेय का द्रव्यमान}}{\text{विलयन का द्रव्यमान}} \times 10^6 \\ &= \frac{0.1}{1000} \times 10^6 \\ &= 100 \text{ g. (PPM)} \end{aligned}$$

NCERT ★

Ques: ★

एक पेय जल के सैंपल में क्लोरीफॉर्म (CHCl_3) सहित अनेक अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, माना यह वर्तमान है। इन अशुद्धियों का लेवल 15 PPM (द्रव्यमान की दृष्टि से) था — (i) इस द्रव्यमान के प्रतिशत में बताइए। (ii) जल के सैंपल में क्लोरीफॉर्म की मात्रा ज्ञात कीजिए।

Solve: 15 PPM का अर्थ है — 15g. क्लोरीफॉर्म 10^6 g. विलयन में उपस्थित है।

(i) दिया है —

$$\begin{aligned} \text{विलेय का द्रव्यमान} &= 15 \text{ g} \\ \text{विलयन का द्रव्यमान} &= 10^6 \text{ g} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{द्रव्यमान \%} &= \frac{\text{विलेय का द्रव्यमान}}{\text{विलयन का द्रव्यमान}} \times 100 \\ &= \frac{15}{10^6} \times 100 \end{aligned}$$

$$= 15 \times 100 \times 10^6$$

$$= 1.5 \times 10^{-3} \%$$

दिया है —

$$\text{विलेय का द्रव्यमान} = 15\text{g.}$$

$$\text{विलेय का अपविक द्रव्यमान} = 119.5\text{g.}$$

$$\text{विलायक का द्रव्यमान} = 10^6 - 15 \approx 10^6$$

$$m = \frac{W_B}{M_B \times W_A} \times 1000$$

$$= \frac{15 \times 1000}{119.5 \times 10^6}$$

$$= \frac{15 \times 1000 \times 10^{-5}}{119.5}$$

$$= 0.01255 \times 10^{-2}$$

$$= 1.255 \times 10^{-4} \text{ mol/kg.}$$

नामोलता

Ques:

NaOH (सोडियम हाइड्रोक्साइड) के 1 लीटर विलयन में 4g. NaOH घुला है, तो विलयन की नामोलता ज्ञात कीजिए।

दिया है —

Ans:

$$\text{विलेय का द्रव्यमान} = 4\text{g.}$$

$$\text{विलेय का तुल्यवर्ती द्रव्यमान} = 40\text{g.}$$

$$\text{विलयन का आयतन} = 1\text{L.}$$

$$N = \frac{W_B}{E_B \times V} \times 1000$$

$$N = \frac{4}{40 \times 1}$$

$$N = 0.1 \text{ ग्राम तुल्यांक / लीटर}$$

Ques: 3.65 g. हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl) 200 ml. विलयन में घुला है, तो विलयन की नार्मलिता ज्ञात कीजिए।

Ans: दिया है—

$$\text{विलय का द्रव्यमान} = 3.65 \text{ g.}$$

$$\text{विलय का तुल्यांकी द्रव्यमान} = 36.5 \text{ g.}$$

$$\text{विलयन का आयतन} = 200 \text{ ml.}$$

$$N = \frac{W_B}{E_B \times V} \times 1000$$

$$N = \frac{3.65 \times 1000}{36.5 \times 200}$$

$$N = \frac{50}{100}$$

$$N = 0.5 \text{ ग्राम तुल्यांकी / लीटर}$$

Ques: 5.3 g. सोडियम कार्बोनेट (Na_2CO_3) 500 ml. विलयन में घुला है, तो विलयन की नार्मलिता ज्ञात कीजिए।

Ans: दिया है—

$$\text{विलय का द्रव्यमान} = 5.3 \text{ g.}$$

विलेय का तुल्यतांक द्रव्यमान = 53g.
 विलयन का आयतन = 500 ml.

$$N = \frac{W_B}{E_B \times V} \times 1000$$

$$= \frac{5.3 \times 1000}{53 \times 500}$$

$$= 0.2 N$$

७ फॉर्मलिता :-

इसे F द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।
 "किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या विलयन की फॉर्मलिता कहलाती है।"

फॉर्मलिता $F = \frac{\text{विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या}}{\text{विलयन का लीटर में आयतन}}$

$$F = \frac{\text{विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या} \times 1000}{\text{विलयन का मिली. में आयतन}}$$

$$F = \frac{\text{विलेय का द्रव्यमान} \times 1000}{\text{विलेय का ग्राम सूत्र} \times \text{विलयन का आयतन}}$$

$$F = \frac{W_B}{E_B \times V} \times 1000$$

Ques:

5.85 g. सोडियम क्लोराइड (NaCl) 200 ml. विलयन में घुला है, विलयन की फॉर्मलिता ज्ञात कीजिए।

Sol: दिया है -

विलेय का द्रव्यमान = 5.85g.

विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान = 58.5g.

विलयन का आयतन = 200ml.

$$F = \frac{W_B}{F_B \times V} \times 1000$$

$$F = \frac{5.85 \times 1000}{58.5 \times 2000}$$

$$F = \frac{5}{10}$$

$$F = 0.5 \text{ ग्राम सूत्र द्रव्यमान / लीटर}$$

विलियम हैनरी

हैनरी का नियम

$K_H \propto$

ताप
विलेयता

इस नियम के अनुसार "स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है।"

हैनरी के नियम का गणितीय रूप :-

माना कि द्रव के ईकाई आयतन में गैस की मात्रा m ग्राम है तथा विलयन के साथ साम्य अवस्था में गैस का दाब p है, तो $m \propto p$

$$m = K p$$

यदि विलयन में गैस के मोल प्रभाव / अंश की उसकी विलेयता की माप मानें, तब हेनरी नियम को अग्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। " किसी विलयन में गैस का मोल अंश (M) उस विलयन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब (P) के समानुपाती होता है, तब

$$M \propto P$$

$$M \propto K_H P$$

$$K_H = \text{हेनरी स्थिरांक}$$

उपर्युक्त संबंध को निम्न प्रकार भी लिखा जा सकता है।

$$P = K_H \times M$$

अनुप्रयोग $\Rightarrow$

(i) कार्बोनेटेड शीतल पेयों के उत्पादनों में $\Rightarrow$

एवं शीतल पेयों में CO_2 की विलेयता बढ़ाने के लिए ^{cold water} शीतल की अधिक दाब पर बंद किया जाता है।

(ii) गहरे समुद्र में श्वास लेने में $\Rightarrow$

गहरे समुद्र में श्वास लेने के लिए गोताखोर ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए संपीड़ित वायु पर निर्भर करते हैं। अधिक वायु-मंडलीय दाब के कारण श्वास के साथ ली गई वायु-मंडलीय गैस ($\text{N}_2 + \text{O}_2$) की रक्त में विलेयता

अधिक हो जाती है। ऑक्सीजन तो शरीर में क्रियात्मक क्रिया में प्रयुक्त हो जाती है, किंतु नाइट्रोजन रक्त में विद्रव्य रहती है। जब गीताखोर स्तन की ओर आते हैं, तब बाहरी दाब धीरे-धीरे कम होने लगता है। इसके कारण बुली हुई नाइट्रोजन गैस बाहर निकलने लगती है। इससे नाइट्रोजन के रक्त में बुलबुले बन जाते हैं। ये बुलबुले तंत्रिका स्फंदनों को प्रभावित कर देते हैं, जिसे "बेइस" कहते हैं। यह अत्यधिक पीड़ा-दायक एवं जानलेवा होती है। इससे बचने के लिए गीताखोर आपकल टैंकों में दिलीयम मिलाकर तनु की वायु का उपयोग करते हैं। सामान्यतः He (11.7%), N_2 (56.2%) तथा O_2 (32.1%) का मिश्रण प्रयुक्त किया जाता है।

(iii) अधिक श्वास लेने में कठिनाई $\Rightarrow$

अधिक ऊँचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतही स्थानों से कम होता है। अतः इन स्थानों पर रहने वाले लोगों एवं पक्षियों के रक्त एवं ऊतकों में ऑक्सीजन की सांद्रता निम्न हो जाती है। इसके कारण कमजोरी महसूस करते हैं और स्पष्ट रूप से सोच नहीं पाते हैं। ये लक्षण "एनॉक्सिया" कहलाता है।

सीमाएँ $\Rightarrow$

हैनरी का नियम केवल निम्न अवस्थाओं में ही लागू होता है —

- I यह नियम तनु विलयन के लिए लागू होता है। यदि गैस द्रव में अत्यधिक विलेय है, तो इस नियम का पूर्ण पालन नहीं होता है।
- II निम्न दाब तथा ताप उच्च होना चाहिए अर्थात् गैस की आदर्श गैस के समान व्यवहार प्रदर्शित करना चाहिए।
- III गैस को विलायक के साथ क्रिया करके कोई यौगिक नहीं बनाना चाहिए तथा विलायक के साथ उसका संयुजन या वियोजन नहीं होना चाहिए।

★ राउल्ट का नियम

राउल्ट का नियम वाष्पशील घटकों के लिए :

" एक निश्चित ताप पर किसी विलयन में उपस्थित वाष्पशील घटकों का आंशिक दाब उस घटक के शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब तथा मोल भ्रमांश / अंश के गुणनफल के बराबर होता है। "

एक वाष्पशील विलयन में घटक A तथा B का आंशिक दाब P_A तथा P_B है। इनका मोल भ्रमांश m_A तथा m_B है। शुद्ध घटकों के वाष्पदाब P_A° तथा P_B° होंगे।

राउल्ट के नियम के अनुसार —

$$P_A \propto M_A$$

$$P_A = P_A^0 \times M_A$$

$$P_B \propto M_B$$

$$P_B = P_B^0 \times M_B$$

डॉल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार —

किसी वाष्पशील विलयन का कुल दाब उसके घटकों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है।

$$P_{\text{total}} = P_A + P_B$$

$$P_{\text{total}} = P_A^0 M_A + P_B^0 M_B$$

$$= P_A^0 (1 - M_B) + P_B^0 M_B \quad \{M_A = 1 - M_B\}$$

$$= P_A^0 - P_A^0 M_B + P_B^0 M_B$$

$$P_{\text{total}} = P_A^0 + (P_B^0 - P_A^0) M_B$$

आदर्श एवं अनादर्श विलयन

जब दो द्रव आपस में घोलते हैं, तो उनसे दो प्रकार के विलयन प्राप्त होते हैं — ① आदर्श विलयन, ② अनादर्श विलयन।

① आदर्श विलयन $\Rightarrow$

“वै विलयन जो सभी सांद्रताओं और सभी तापों पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, “आदर्श विलयन” कहलाते हैं।

$$P_A = P_A^\circ \cdot x_A$$

$$P_B = P_B^\circ \cdot x_B$$

इसका आयतन परिवर्तन (ΔV) तथा ऐंथैल्पी परिवर्तन (ΔH) शून्य रहता है।

आदर्श विलयन के गुण निम्नलिखित हैं—

- I कन्ट्रै राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए।
अर्थात् $P_A = P_A^\circ \cdot x_A$, $P_B = P_B^\circ \cdot x_B$
- II ऐंथैल्पी परिवर्तन (ΔH) शून्य होना चाहिए अर्थात् $\Delta_{\text{mix}} H = 0$
- III आयतन परिवर्तन शून्य होना चाहिए अर्थात् $\Delta_{\text{mix}} V = 0$
- IV A-A, B-B तथा A-B अन्योन्य आकर्षण समान होना चाहिए।

उदा०—

बेंजीन तथा टॉलुईन

n-हेक्सेन तथा n-हेप्टेन

क्लोरोबेंज़िन तथा ब्रोमोबेंज़िन

क्लोरोएथेन तथा आइडोएथेन

एनल तथा MCA

② अनादर्श विलयन $\Rightarrow$

वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते तथा मिके बन्न पर ऐंथैल्पी और आयतन दोनों में परिवर्तन होता है, "अनादर्श विलयन" कहलाते हैं।

अनादर्श विलयन के गुण निम्नलिखित हैं —

- I उसी राउन्ट के नियम का पालन नहीं करना चाहिए
अर्थात् $P_A \neq P_A^\circ$ तथा $P_B \neq P_B^\circ$
- II ऐंथैल्पी परिवर्तन (ΔH) शून्य नहीं होना चाहिए
अर्थात् $\Delta_{mix} H \neq 0$
- III आयतन परिवर्तन (ΔV) शून्य नहीं होना चाहिए
अर्थात् $\Delta_{mix} V \neq 0$
- IV A-A, B-B तथा A-B अन्यान्य आकर्षण समान नहीं होना चाहिए।

अनादर्श विलयन को दो वर्गों में बाँटा गया है —

- ① व विलयन जो धनात्मक विचलन दर्शाते हैं।
- ② व विलयन जो ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं।

① धनात्मक विचलन $\Rightarrow$

इस प्रकार के विचलन में प्रत्येक द्रव (A अथवा B) का आंशिक वाष्पदाब राउन्ट के नियम के आधार पर आपेक्षित वाष्पदाब से अधिक होता है। यह विचलन उन विलयनों द्वारा दर्शाया जाता है, जिनमें A-B अन्यान्य आकर्षण A-A तथा B-B अन्यान्य आकर्षण से कम होता है। इनका आयतन में परिवर्तन तथा ऐंथैल्पी में परिवर्तन धनात्मक होता है।

उदा० — ऐथेनॉल तथा एसीटोन

एसीटोन तथा कार्बन डाइसल्फाइड

एसीटोन तथा बेंजीन

धनात्मक विचलन के कारण $\Rightarrow$

उदा० के लिए ऐथेनॉल तथा ऐसीटीन के मिश्रण इस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ऐथेनॉल में अनेक अणु एक-दूसरे से हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। ऐसीटीन मिलाने पर, ऐसीटीन के अणु ऐथेनॉल अणुओं के महत्वपूर्ण कोर पारित हैं तथा हाइड्रोजन बंधों को तोड़कर एक नया आकर्षण बनाते हैं, जो कि दुर्बल होता है, जिससे उनके वाष्पदाब में कुछ वृद्धि होती है।

धनात्मक विचलन के गुण $\Rightarrow$

$$P_A > P_A^0 \text{ म.अ.} , P_B > P_B^0 \text{ म.अ.}$$

$$\Delta_{\text{mix}} H = +ve$$

$$\Delta_{\text{mix}} V = +ve$$

$$A-B < A-A \text{ \& } B-B$$

② ऋणात्मक विचलन $\Rightarrow$

इस प्रकार के विलयनों में प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्पदाब राउल्ट नियम द्वारा अपेक्षित वाष्पदाब से कम होता है। इस प्रकार का विचलन उन विलयनों द्वारा दर्शाया जाता है, जिनमें A-B अन्योन्य आकर्षण A-A तथा B-B से अधिक होता है।

उदा०- फीनॉल तथा ऐनिलीन
क्लोरोफॉर्म तथा ऐसीटीन
क्लोरोफॉर्म तथा बेंजीन

त्रैणाल्मक विचलन का कारण $\Rightarrow$

क्लोरीफॉर्म और ऐसीटीन का मिश्रण राउल्ट नियम से त्रैणाल्मक विचलन प्रदर्शित करता है। क्लोरीफॉर्म और ऐसीटीन अलग-अलग उपस्थित रहने पर हाइड्रोजन बंध स्थापित नहीं करते हैं, किंतु जब इन परस्पर मिलाया जाता है, तब दोनों अणु के मध्य हाइड्रोजन बंध स्थापित हो जाता है, जिससे इनके बीच का आकर्षण प्रबल हो जाता है और इनके वाष्पदाब कम हो जाते हैं।

त्रैणाल्मक विचलन के गुण $\Rightarrow$

$$P_A < P_A^0 \text{ म.अ.}, \quad P_B < P_B^0 \text{ म.अ.}$$

$$\Delta_{\text{mix}} H = -ve$$

$$\Delta_{\text{mix}} V = -ve$$

$$A-B > A-A \text{ \& } B-B$$

आदर्श तथा अनादर्श विलयन में अंतर



<u>आदर्श विलयन</u>	<u>अनादर्श विलयन</u>
ताप एवं दाब की संपूर्ण परास में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। अर्थात्	ताप एवं दाब की संपूर्ण परास में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं अर्थात्
$P_A = P_A^0 \text{ म.अ.}, P_B = P_B^0 \text{ म.अ.}$	$P_A \neq P_A^0 \text{ म.अ.}, P_B \neq P_B^0 \text{ म.अ.}$

एंट्रॉपी परिवर्तन शून्य होता है अर्थात् $\Delta_{\text{mix}} H = 0$

जन्म एंट्रॉपी परिवर्तन शून्य नहीं होता है अर्थात् $\Delta_{\text{mix}} H \neq 0$

आयतन परिवर्तन शून्य होता है अर्थात् $\Delta_{\text{mix}} V = 0$

आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होता है अर्थात् $\Delta_{\text{mix}} V \neq 0$

A-A, B-B तथा A-B
अन्योन्य आकर्षण समान होते हैं।

A-A, B-B तथा A-B
अन्योन्य आकर्षण समान नहीं होते हैं।

उदा० - बेंजीन तथा टॉलुईन

उदा० - ऐथेनॉल तथा ऐसीटोन

घनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन में अंतर



घनात्मक विचलन

विलयन का वाष्पदाब व द्रवकों के आंशिक दाबों के मान राउल्ट नियम द्वारा परिकल्पित मानों से अधिक होते हैं। $P_A > P_A^0$ मम, $P_B > P_B^0$ मम

एंट्रॉपी परिवर्तन घनात्मक होता है। $\Delta_{\text{mix}} H = +ve$
इस प्रकार के विलयन बज्ज पर ऊष्मा अवशोषित होती है।

ऋणात्मक विचलन

विलयन का वाष्पदाब व द्रवकों के आंशिक दाबों के मान राउल्ट नियम द्वारा परिकल्पित मानों से कम होते हैं। $P_A < P_A^0$ मम, $P_B < P_B^0$ मम

एंट्रॉपी परिवर्तन ऋणात्मक होता है। $\Delta_{\text{mix}} H = -ve$
इस प्रकार के विलयन बज्ज पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है।

आयतन परिवर्तन क्षणात्मक होता है। $\Delta m \propto V = +ve$

आयतन परिवर्तन त्रहणात्मक होता है। $\Delta m \propto V = -ve$

यै निम्न क्वाथी एजियोट्रोप बनाते हैं।

यै उच्च क्वाथी एजियोट्रोप बनाते हैं।

A-B अन्यान्य आकर्षण
A-A तथा B-B अन्यान्य
आकर्षण से कम होता है।

A-B अन्यान्य आकर्षण
A-A तथा B-B अन्यान्य
आकर्षण अधिक होता है।

उदा० - एथेनॉल तथा ऐसीटोन

उदा० - क्लोरोफॉर्म तथा ऐसीटोन

★ स्थिर क्वाथी मिश्रण / एजियोट्रोप

★ "ऐसे विलयन जो बिना संघटन के परिवर्तन के एक ही ताप पर आस्रवित हो जाते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण या 'एजियोट्रोप' कहलाते हैं।" जैसे मिश्रण में उसके घटकों की प्रभावी आस्रवन द्वारा पृथक् नहीं किया जा सकता।

अथवा

"कुछ द्रव के मिश्रण (विलयन) एजियोट्रोप बनाते हैं, जिनका संघटन वाष्प तथा द्रव अवस्था में समान होता है तथा इनकी प्रभावी आस्रवन द्वारा पृथक् नहीं किया जा सकता।"

उदा० - एथेनॉल (95%) तथा जल (5%) का मिश्रण स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है।

स्थिर क्वाथी मिश्रण दो प्रकार के होते हैं —

(1) निम्न क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण ⇒

ऐसे विलयन जो सल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं अर्थात् इनका वाष्पदाब उच्च होता है "निम्न क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण" कहलाते हैं।

उदा० - ऐथेनॉल (95% / 95.6%) जल (5% / 4.4%) का मिश्रण निम्न क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है।

(2) उच्च क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण ⇒

ऐसे विलयन जो सल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं अर्थात् इनका वाष्पदाब उच्च होता है "उच्च क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण" कहलाते हैं।

उदा० -

68% नारदिक अम्ल 32% जल का मिश्रण

*** अणुसंख्य गुणधर्म

"विलयनों के अणुसंख्य गुण वे गुण हैं जो विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि उनकी प्रकृति पर।"

अणुसंख्य गुणधर्म चार प्रकार के होते हैं —

(i) वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन -

(ii) क्वथनांक में उन्नयन

(iii) हिमांक में अवनमन

(iv) परास्फरण दाब

(i) वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन (राउल्ट का नियम) :-

अथवा

स्थिर दबाव पर किसी विलयन का आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है।

जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय (पदार्थ) घोल दिया जाता है, तो विलेय के अणु विलायक के अणुओं में घुल जाते हैं, जिससे उसका वाष्पदाब कम हो जाता है। वाष्पदाब अवनमन तथा मोल प्रभाज के मध्य संबंध को राउल्ट के एक नियम के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं।

इस नियम के अनुसार " किसी द्रव द्रव्य पर किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्पदाब उसमें विद्यमान विलायक के मोल प्रभाज / अंश के समानुपाती होता है।

विलयन का वाष्पदाब (P_A) व विलयन में विलायक का मोल प्रभाज

$$P_A \propto M_A$$

$$P_A = P_A^0 M_A$$

P_A^0 = शुद्ध विलायक का वाष्पदाब

विलयन तथा विलायक के वाष्पदाब के अंतर को निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं।

$$\Delta P_A = P_A^0 - P_A$$

$$\Delta P_A = P_A^0 - P_A^0 m_A$$

$$\Delta P_A = P_A^0 (1 - m_A) \quad \text{or} \quad (m_B = 1 - m_A)$$

$$\Delta P_A = P_A^0 m_B$$

$$P_A^0 - P_A = P_A^0 m_B$$

$$\boxed{\frac{P_A^0 - P_A}{P_A^0} = m_B}$$

$P_A^0 - P_A$ वाष्पदाब में अवनमन तथा $\frac{P_A^0 - P_A}{P_A^0}$ वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन होता है। P_A^0 वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल भ्रंश के बराबर होता है। यह राउल्ट का नियम कहलाता है।

वाष्पदाब अवनमन की सहायता से विलेय का अणुभार या आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए।

राउल्ट के नियम से,

$$\frac{P_A^0 - P_A}{P_A^0} = m_B \quad \text{--- (1)}$$

यदि m_B व. विलेय को m_A व. विलायक में घोला जाता है तथा विलेय और विलायक के आणविक द्रव्यमान क्रमशः M_B व M_A हैं, तो

$$\text{विलायक का मोल } (n_B) = \frac{W_B}{M_B}$$

$$\text{विलायक का मोल } (n_A) = \frac{W_A}{M_A}$$

$$\text{विलय का मोल प्रमाण } (m_B) = \frac{n_B}{n_A + n_B}$$

तनु विलयन के लिए n_B का मान नगण्य माना जाता है $n_B \ll n_A$

$$m_B = \frac{n_B}{n_A}$$

$$m_B = \frac{W_B}{M_B}$$

$$\frac{W_A}{M_A}$$

$$m_B = \frac{W_B \times M_A}{M_B \times W_A}$$

$$C_6H_6 = 78$$

$$(72 + 6)$$

m_B का मान समी. 0 में रखने पर —

$$\frac{P_A^0 - P_A}{P_A^0} = \frac{W_B \times M_A}{M_B \times W_A}$$

$$M_B = \frac{W_B \times M_A \times P_A^0}{W_A \times (P_A^0 - P_A)}$$

NCERT

Ques:

एक निश्चित ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्पदाब 0.850 बार है। एक अवाष्पशील विद्युत अपघट्य 0.5g की 39g बेंजीन में मिलाया गया है।

(बेंजीन का आणविक द्रव्यमान = 78 g./m.) 1 विलयन का वाष्पदाब 0.845 bar है, तो विलायक का आणविक द्रव्यमान क्या होगा ?

दिया है —

$$P_A^0 = 0.850 \text{ bar}$$

$$P_A = 0.845 \text{ bar}$$

$$W_B = 0.5 \text{ g.}$$

$$W_A = 39 \text{ g.}$$

$$M_A = 78 \text{ g./mol}$$

$$M_B = ?$$


$$M_B = \frac{W_B \times M_A \times P_A^0}{W_A \times (P_A^0 - P_A)}$$

$$= \frac{0.5 \times 78 \times 0.850}{39 \times (0.850 - 0.845)}$$

$$= \frac{33.15}{0.005}$$

$$= 170 \text{ g./mol.}$$

अणुवजनिक में उन्नयन $\Rightarrow$



किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है, जिसपर किसी द्रव का वाष्पदाब का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। हमें यह भी ज्ञात है, कि किसी विलायक का वाष्पदाब शुद्ध विलायक के वाष्पदाब से कम होता है। अतः वह ताप जिसपर किसी विलयन का वाष्पदाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है अर्थात् (विलयन का क्वथनांक T_b), उस ताप से अधिक होगा जिसपर शुद्ध विलायक का वाष्पदाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है अर्थात् शुद्ध विलायक का क्वथनांक। कहने का तात्पर्य यह है कि शुद्ध विलायक में कोई विलेय मिला देने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है।

ΔT_b क्वथनांक में उन्नयन होता है। T_b का मान T_b° से अधिक है, अतः विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से अधिक है। शुद्ध विलायक की अपेक्षा विलयन उच्च ताप पर उबलता है। अतः विलेय को विलायक में घोलने से उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को "क्वथनांक का उन्नयन" कहते हैं। अतः

$$\Delta T_b = T_b - T_b^\circ$$

प्रयोगों के आधार पर यह पाया गया है, कि क्वथनांक में उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है।

$$\Delta T_b \propto \text{मोललता (m)}$$

$$\Delta T_b = K_b \times m$$

K_b = क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक या मोलल क्वथनांक स्थिरांक या क्वथनांक मापी स्थिरांक

(K_b) मूलतः वथनांक स्थिरांक है

मूलतः वथनांक उन्नयन स्थिरांक 1 मूलतः विलयन (अर्थात् ऐसा विलयन जिसमें एक 1 ग्राम विलेय के मूल 1000 ग्राम विलायक में विलेय किया गया हो) के लिए वथनांक में उन्नयन के बराबर होता है।

यदि $m=1$,

$$\Delta T_b = K_b$$

$$K_b \text{ की इकाई} = K \text{ Kg mol}^{-1}$$

वथनांक में उन्नयन द्वारा विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना —

वथनांक में उन्नयन ΔT_b का प्रायोगिक निर्धारण करके अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है।

किसी अवाष्पशील विलेय के विलयन के लिए

$$\Delta T_b = K_b \times m$$

मान ली M_B g. अवाष्पशील विलेय M_A g. विलायक में घुला है तथा विलेय का आणविक द्रव्यमान M_B g. है। अतः

$$\text{मोललता } (m) = \frac{M_B \times 1000}{M_A \times M_B}$$

जल का क्वथनांक = 373.15 K
 100°C

$$\Delta T_b = \frac{K_b \times W_B \times 1000}{M_B \times W_A}$$

$$M_B = \frac{K_b \times W_B \times 1000}{\Delta T_b \times W_A}$$

NCERT

Ques: बेंजीन का क्वथनांक 353.23 K है। जब 1.8 g अवाष्पशील विनैय को 90 g बेंजीन में मिलाया था, तो क्वथनांक में वृद्धि 354.11 K हुई। विनैय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। बेंजीन के लिए $K_b = 2.53 \text{ K.Kg.mol}^{-1}$

Ans: दिया है —

$$T_b^0 = 353.23 \text{ K}$$

$$T_b = 354.11 \text{ K}$$

$$W_B = 1.8 \text{ g}$$

$$W_A = 90 \text{ g}$$

$$M_B = ?$$

$$K_b = 2.53 \text{ K Kg mol}^{-1}$$

$$\Delta T_b = T_b - T_b^0$$

$$= 354.11 - 353.23$$

$$= 0.88$$

$$M_B = \frac{K_b \times W_B \times 1000}{\Delta T_b \times W_A}$$

$$= \frac{2.53 \times 1.8 \times 1000}{0.88 \times 90}$$

$$= 57.5 \text{ g/mol}$$

NCERT

Ques:

एक सॉलरपैन (पात्र) में 18 g. ग्लूकोस (आणविक द्रव्यमान = 180 g./mol) को 1 K.g. जल में घोला गया है। 1.013 bar सदाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा? जल के लिए K_b का मान $0.52 \text{ K Kg mol}^{-1}$

Solue:

दिया है —

$$T_b^0 = 373.15 \text{ K.}$$

$$T_b = ?$$

$$W_B = 18 \text{ g.}$$

$$W_A = 1 \text{ K.g.}$$

$$M_B = 180 \text{ g/mol}$$

$$K_b = 0.52 \text{ K.Kg mol}^{-1}$$

$$\Delta T_b = \frac{K_b \times W_B}{M_B \times W_A}$$

$$= \frac{0.52 \times 18}{180 \times 1}$$

$$= 0.052 \text{ K}$$


$$\Delta T_b = T_b - T_b^0$$

$$= 0.052 \text{ K} = T_b - 373.15$$

$$T_b = 373.15 + 0.052$$

$$T_b = 373.202 \text{ K.}$$

(iii) हिमांक में अपवनमन $\Rightarrow$



जब किसी विलायक को ठंडा किया जाता है, तब वह किसी ताप पर जम जाता है। इस ताप को विलायक का हिमांक कहते हैं। इस ताप पर पदार्थ की ठोस और द्रव अवस्थाओं का वाष्पदाब समान होता है तथा पदार्थ की ठोस और द्रव अवस्थाएँ एक-दूसरे के साम्य में रहती हैं। हम जानते हैं कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है, तब उसका वाष्पदाब कम हो जाता है; इस लिए यह आशा की जाती है कि विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक की अपेक्षा कम होता है। इसे हिमांक में अपवनमन कहते हैं।

ऊर्ध्व ग्राफीय रूप में दर्शाया गया है। इसमें वक्र BC और DE क्रमशः शुद्ध विलायक और विलयन के वाष्पदाब का प्रदर्शन करते हैं। B बिंदु पर द्रव और ठोस विलायक के वाष्पदाब परस्पर मिलते हैं।

यह बिंदु शुद्ध विलायक के हिमांक (T_f°) को प्रदर्शित करता है, अतः ताप T_f विलायक का हिमांक है। इसी प्रकार ताप T_f विलयन का हिमांक है। इन दो तापों का अंतर हिमांक में अवनमन (ΔT_f) कहलाता है।

$$\Delta T_f = T_f^\circ - T_f$$

प्रयोगों के आधार पर ऐसा देखा गया है कि किसी विलयन में विलायक के हिमांक में कमी उसमें घुले हुए विलेय के मौलल सांद्रण (मौललता) के समानुपाती होती है।

$$\Delta T_f \propto \text{मौललता } (m)$$

$$\Delta T_f = K_f \times m$$

K_f एक स्थिरांक है, जिसे मौलल हिमांक अवनमन स्थिरांक या हिमांक अवनमन स्थिरांक या कार्याय-कौपिक स्थिरांक कहते हैं।

$$\text{मौलल हिमांक अवनमन स्थिरांक}^{(K_f)} \Rightarrow$$

मौलल हिमांक स्थिरांक एक मौलल विलयन (अर्थात् ऐसा विलयन जिसमें एक ग्राम विलेय के मौल 1000 g. विलायक में विलेय किया गया हो) के लिए हिमांक में अवनमन के बराबर होता है।

यदि

$$m = 1$$

$$\Delta T_f = K_f$$

यदि W_B g. विलेय को W_A g. विलायक में घोला जाए तथा उसका आण्विक द्रव्यमान M_B हो, तो

$$m = \frac{W_B}{M_B \times W_A} \times 1000$$

हिमांक में अवनमन के द्वारा

$$\Delta T_f = K_f \times m$$

$$\Delta T_f = \frac{K_f \times W_B \times 1000}{M_B \times W_A}$$

$$M_B = \frac{K_f \times W_B \times 1000}{\Delta T_f \times W_A}$$

NCERT

Ques:

एक वैद्युत अनअपघट्य के 1g. को 50g. बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में 0.40 K की कमी हो जाती है। बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक $5.12 \text{ K.Kg. mol}^{-1}$ है। विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए।

Soln:

दिया है—

$$W_B = 1g$$

$$W_A = 50g.$$

$$M_B = ?$$

$$\Delta T_f = 0.40 \text{ K}$$

$$K_f = 5.12 \text{ K.Kg.mol}^{-1}$$

$$M_B = \frac{K_f \times W_B \times 1000}{\Delta T_f \times W_A}$$

$$M_B = \frac{5.12 \times 1 \times 1000}{0.40 \times 50}$$

$$= 256 \text{ g/mol}$$

NCERT

Ques:

45g. ऐथिलीन ग्लाइकोल ($C_2H_6O_2$) को 600g. जल में मिलाया गया है। विलयन के

(i) हिमांक में अवनमन

(ii) विलयन के हिमांक की गणना कीजिए।

(जल के लिए K_f का मान $1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$)

दिया है—

Solue:

$$W_B = 45 \text{ g.}$$

$$W_A = 600 \text{ g.}$$

$$M_B = 62 \text{ g/mol}$$

$$\Delta T_f = T_f - T_r$$

$$K_f = 1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$$

$$(i) \quad \Delta T_f = \frac{K_f \times W_B \times 1000}{M_B \times W_A}$$

$$\Delta T_f = \frac{1.86 \times 45 \times 1000}{62 \times 600}$$

$$= 2.25 \text{ K}$$

(ii) शुद्ध जल का हिमांक $0^{\circ}\text{C} = 273.15\text{ K}$.

$$\Delta T_f = T_f^{\circ} - T_f$$

$$2.25 = 273.15 - T_f$$

$$T_f = 273.15 - 2.25$$

$$= 270.90\text{ K}$$

Note:-

① हिमांक में अवनमन के गुण का उपयोग एथिलीन ग्लाइकोल का एक एंटीफ्रीज के रूप में प्रयुक्त करके किया जाता है। कारों के रेडिएटर में जल प्रयुक्त किया जाता है। ठंडे देशों में ताप शून्य 0°C से कम हो जाता है, जिससे रेडिएटर का पानी जम जाता है। इस जल में एथिलीन ग्लाइकोल मिला देने से जल का हिमांक कम हो जाता है अर्थात् अब यह शून्य 0°C पर नहीं जमता है, बल्कि इससे कम ताप पर जमता है और रेडिएटर ठीक प्रकार से कार्य करता रहता है।

② निम्नलिखित सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग सड़क से बर्फ हटाने के लिए किया जाता है, यह जल के हिमांक को कम करता है तथा उस ताप को कम करता है, जिसपर बर्फ का बनना रोक दिया जाता है।

(ii) परास्रण एवं परास्रण दाब $\Rightarrow$

परास्रण $\Rightarrow$

" वह प्रक्रिया, जिसमें शुद्ध विलायक के कण कम सांद्र विलयन में से उच्च सांद्र विलयन में अर्द्धपारगम्य झिल्ली में से होते हुए प्रवाहित होते हैं। परास्रण अथवा परास्रणीय बहाव कहलाती है। "

परास्रण दाब $\Rightarrow$

" वह न्यूनतम आधिक्य बल जिसको विलयन पर आरोपित करने से विलायक का अर्द्धपारगम्य झिल्ली में से होते हुए विलयन में प्रवेश रुक जाता है, परास्रण दाब कहलाता है। " इसे π से दर्शाते हैं।

अथवा

" परास्रण दाब वह द्रव स्थैतिक दाब है, जो विलयन को विलायक से अर्द्धपारगम्य झिल्ली से पृथक् रखने पर विलायक के अणुओं को विलयन में प्रवेश होने से रोकता है, परास्रण दाब कहलाता है। "

सम परास्रण विलयन $\Rightarrow$

ऐसे दो विलयन जिनका परास्रण दाब समान होता है, जिन्हें अर्द्धपारगम्य झिल्ली से पृथक् रखने पर विलायक का किसी भी ओर कोई बहाव नहीं होता है, समपरास्रणी विलयन कहलाते हैं। " उदा० - 0.9% NaCl नमक का जलीय विलयन रक्त सीरम के समपरास्रणी होता है। "

अल्प परासरी विलयन $\Rightarrow$

"वे विलयन जिनका परासरण दाब दिये गये विलयन के परासरण दाब से कम होता है, अल्प परासरी विलयन कहलाते हैं।"
 उदा० - 0.9% द्रव्यमान / आयतन ($\frac{w}{v}$) से कम नमक का जलीय विलयन रक्त सीरम के लिए अल्प परासरी होता है।

अति परासरी विलयन $\Rightarrow$

"वे विलयन जिनका परासरण दाब दिये गये विलयन के परासरण दाब से अधिक होता है, अति परासरी विलयन कहलाते हैं।"
 उदा० - 0.9% $\frac{w}{v}$ से अधिक नमक का जलीय विलयन रक्त सीरम के लिए अति परासरी होता है।

Note:-

- ① यदि किसी कोशिका को समपरासरी विलयन में रखा जाए, तो उसमें कोई परासरण नहीं होता।
- ② यदि किसी कोशिका को अति परासरण विलयन में रखा जाए तो वह सिकुड़ जाती है।
- ③ यदि किसी कोशिका को अल्प परासरी विलयन में रखा जाए तो वह फूल जाती है।

वॉण्ट हॉफ समीकरण

किसी अवाहपशील विलेय के तनु विलयन का परासरण दाब (π) विलयन के परम ताप (T) के समानुपाती होता है, जब विलयन का सांद्रण (C) स्थिर हो, इसे वॉण्ट हॉफ नियम कहते हैं।

$$\pi \propto T \quad (C \text{ स्थिर है})$$

$$\pi \propto C \quad (T \text{ स्थिर है})$$

व्युत्पत्ति $\Rightarrow$

(1) परासरण दाब विलयन के मोलरता (C) के समानुपाती होता है।

$$\pi \propto C T$$

$$\pi \propto R C T \quad \{R = \text{गैस स्थिरांक}\}$$


$$\pi = \frac{R T}{V}$$

$$\pi V = R T$$

इसे वॉण्ट हॉफ आदर्श विलयन समी. कहते हैं।

$$R = 0.0821 \text{ L atm K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$$

बर्कले-हार्टले विधि



● बर्कले और हार्टले की विधि

इस उपकरण में दो समकेंद्रिक नलियाँ होती हैं, जिनमें भीतरी नली संद्रण होती है। भीतरी संद्रण नली पर विद्युत विधि से कॉपर फ्लोसाइनाइड की अर्धपारगम्य झिल्ली बना दी जाती है। इसके एक सिरे पर कैल्शिका नली तथा दूसरे सिरे पर टॉटीदार कीप लगाते हैं। संद्रण नली को धीरे धीरे गनमेटल की बनी एक बाहरी नली होती है। इसमें जलरोधक क्रिस्टल लगा होता है, जिससे विलयन की सतह पर दाब डाला जाता है। भीतरी नली में आयुत जल भर दिया जाता है, जो कैल्शिका नली में एक निशान तक होता है। बाहरी नली में वह विलयन भरते हैं, जिसका परास्रण दाब ज्ञात करना होता है।

परास्परण के द्वारा भीतरी नली से झिल्ली द्वारा जल का प्रवाह विलयन की ओर होता है और कौशिका नली में जलस्तर नीचे आने लगता है। अब क्रिस्टल द्वारा विलयन पर दाब डालकर कौशिका नली में जलस्तर पूर्व निशान पर स्थिर रखा जाता है। स्थायी स्थिति आने पर क्रिस्टल द्वारा जो दाब लगाया जाता है, वह विलयन का परास्परण दाब होता है।

बर्कले - हार्टले विधि के लाभ $\Rightarrow$

इस विधि के निम्नलिखित लाभ हैं—

- (1) परास्परण दाब निकालने में कम समय लगता है।
- (2) विलयन की सांद्रता न बदलने से परिणाम सही मिलते हैं।
- (3) अर्द्धपारगम्य झिल्ली पर अधिक दाब न पड़ने से वह टूटती नहीं है।
- (4) उच्च परास्परण दाब का मापन किया जा सकता है।

प्रतिलोम परासरण

(Reverse Osmosis)

यदि किसी विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए, तो परासरण की दिशा की प्रतिक्रिया (विपरीत) किया जा सकता है, अर्थात् शुद्ध विलायक अब अवर्गम्य झिल्ली के माध्यम से विलयन में से पारगमन करता है। यह परिवर्तन "प्रतिलोम परासरण" कहलाती है। प्रतिलोम परासरण का उपयोग समुद्री जल के विलवणीय-करण में किया जाता है।

प्रतिलोम परासरण के लिए आवश्यक दाब बहुत अधिक होता है। इसके लिए उपयुक्त झिल्ली सैल्युलोज़ ऐसिटेट जल के लिए पारगम्य है, परंतु समुद्री जल में उपस्थित अशुद्धियों एवं आयनों के लिए अपारगम्य है।

असामान्य आण्विक द्रव्यमान

"वो आण्विक द्रव्यमान जो सामान्य से या तो अधिक होगा या कम, ऐसे आण्विक द्रव्यमान को असामान्य आण्विक द्रव्यमान कहा जाता है।"

इसके निम्न कारण होते हैं—

विलेय के अणुओं का संयुजन $[AB \rightarrow A' + B']$
 विलेय के अणुओं का विघटन $[2A \rightarrow A_2]$

वॉण्ट हॉफ गुणांक

सन् 1886 में वॉण्ट हॉफ ने एक व्युत्क्रम या गुणांक j दिया, जिसे वॉण्ट हॉफ गुणांक कहते हैं। इसके द्वारा विलयन में विलेय के संगुणन या वियोजन की सीमा का ज्ञात होता है। वॉण्ट हॉफ गुणांक सामान्य आणविक द्रव्यमान तथा असामान्य आणविक द्रव्यमान का अनुपात होता है।

$$j = \frac{\text{सामान्य आणविक द्रव्यमान}}{\text{असामान्य आणविक द्रव्यमान}}$$

$$j = \frac{\text{अणुसंख्य गुण का प्रेक्षित मान}}{\text{अणुसंख्य गुण का सैद्धांतिक मान}}$$

अनुप्रयोग

यदि $j = 1$ (कोई संगुणन या वियोजन नहीं होगा)

यदि $j > 1$ (विलेय में वियोजन होगा)

यदि $j < 1$ (विलेय में संगुणन होगा)

अर्द्ध पारगम्य झिल्ली

अर्द्ध पारगम्य झिल्ली के छिद्रों से केवल विलेयक के ही कण पार हो सकते हैं। विलेय के कण नहीं, वनस्पति

जगत तथा जंतु जगत में ऐसी झिल्लियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें अर्द्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है।

उदा० - चर्मपत्र, सैलीफेन, कॉपर फेरोसाइनाइट, सुमुश्री विलवनीकरण में।

ठोस की द्रव में विलेयता

ठोस की द्रव में विलेयता मुख्य चार कारकों पर निर्भर करती है -

विलेय और विलायक की संकृति :

यदि विलेय और विलायक की संकृति समान हो, तो दोनों आपस में पूर्णतः विलेय हो जाते हैं। परंतु जब जैसे द्रवीय विलायक में अशुद्धीय विलेय मिलाने पर वह विलेय नहीं होता।
जैसे - नमक जल में पूर्णतः विलेय होता है, परंतु बेबेंजीन में अविलेय होता है।

ताप :

ताप में वृद्धि के साथ ठोस की द्रव में विलेयता बढ़ती है।

दाब :

दाब ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित नहीं करता है।

पञ्चशर्णां मी उन्नयन 42 - 46

हिमां मी अवनमन 47 - 51

परास्पर्श दाब 52 - 53

घाष्पदाब मी आपेक्षिक अवनमन का राउन्ट नियम 39


आदर्श/अनादर्श मी अंतर 35

धनात्मक & ऋणात्मक विचलन मी अंतर 35

मीलनता & मीलनता मी अंतर 10

समपरास्पर्शी, अल्पपरास्पर्शी, अतिपरास्पर्शी 52 - 53

उस सेल के EMF (सेल विभव) की गणना कीजिए जिसमें निम्नलिखित आर्ध-क्रिया होती है —



दिया है —

$$E^\circ_{\text{cell}} = 1.05 \text{ V.}$$