


पाठ : 8

ऐल्डहाइड, कीटोन
एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल

सामान्य परिचय


ऐल्डहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल एक कार्बोनिल समूह ($M=O$) युक्त यौगिक होते हैं। यदि कार्बोनिल समूह ऐल्किल तथा हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है, तब वह ऐल्डहाइड कहलाता है। यदि कार्बोनिल समूह की ऐल्किल समूह से जुड़ा होता है, तब वह कीटोन कहलाता है। यदि कार्बोनिल समूह से जुड़ा होता है, तब वह कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है।



अथ




ऐल्डहाइड



अथ



कीटोन



अथ



कार्बोक्सिलिक
अम्ल

नामकरण


ऐल्डिहाइड :

ऐडिहाइड के सामान्य नाम कार्बोक्सिलिक अम्ल के अणु लगन, इस अम्ल के स्थान पर ऐडिहाइड जोड़ दिया जाता है।


IUPAC नाम में ऐल्केन का E हटाकर अनुलगन HJ लगा दिया जाता है।

	<u>सामान्य नाम</u>	<u>IUPAC नाम</u>
HCHO	फार्मालिन्डिहाइड	मैथेनल
CH_3CHO	ऐसीटैलिन्डिहाइड	एथेनल
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO}$	प्रोपीऑनैलिन्डिहाइड	प्रोपेनल
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CHO}$	ब्यूटीरैलिन्डिहाइड	ब्यूटेनल
$\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CHO} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	आइसोब्यूटीरैलिन्डिहाइड	2-मैथिल प्रोपेनल


क्रियात्मक समूह	पूर्वलिखन	अनुमान
COOH	कार्बोक्सि	औसक अम्ल
CHO	फॉर्मिल	अल
$>C=O$	कीटो या ऑक्सा	ऑन
OH	हाइड्रॉक्सि	ऑल




3 - हाइड्रॉक्सि - 2 - मीथिल ब्यूटेनल




2 - एथिल - 4 - मीथिल पेन्टेनल



बेंजालिडहाइड



3-क्लोरो
बेंजालिडहाइड



2-क्लोरो - 4 - नाइट्रो
बेंजालिडहाइड


★ कीरीनः

कीरीन का सामान्य नाम - दोनी ऐल्किन समूह के आधार पर लिखा जाता है, IUPAC नाम में ऐल्किन का E हटाकर अनुत्तरण ऑन जोड़ दिया जाता है।




डाइमैथिल कीरीन

एसीटोन




ऐथिल मैथिल कीरीन

ब्यूटेनॉल




डाइऐथिल कीरीन

पेंटेन-3-ऑन




3-क्लोरी - 4-कीरी पेंटेनॉल


(ऑक्सा)




4-ब्रोमो - 3-मिथिल पेंटेन - 2-ऑन




मिथिल फेनिल कीटोन
एसीटोफीनोन



एथिल फेनिल कीटोन (प्रोपिऑफिनोन)
1-फेनिल प्रोपेन - 1-ऑल



P. नाइट्रो एसीटोफीनोन
4-नाइट्रो एसीटोफीनोन




पैरेंट - 2, 4 - डाइऑक्साइड


कार्बोक्सिलिक अम्ल :

कार्बोक्सिलिक अम्ल के सामान्य नाम उनके मिलने के सूत्रों पर निर्भर करता है, कि वह कहाँ से प्राप्त होते हैं। IUPAC नाम में ऐल्केन (Alkane) का E हटाकर आनुलम्बन 'ऑइक अम्ल' छोड़ दिया जाता है।


	सामान्य	IUPAC
HCOOH	फॉर्मिक अम्ल	मैथेनॉइक अम्ल
CH_3COOH	ऐसीटिक	एथेनॉइक
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$	प्रोपिऑनिक	प्रोपेनॉइक
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{C}$	ब्यूटिरिक	ब्यूटेनॉइक
$\text{CH}_3 - \underset{\underset{\text{CH}_3}{ }}{\text{CH}} - \text{COOH}$	अण्णा ब्यूटिरिक	2-मैथिल प्रोपेनॉइक



बेन्जोइक अम्ल
बेन्जीन कार्बोक्सिलिक अम्ल




p-क्लोरी - 2 मीथिल बेन्जोइक अम्ल




फैलिक अम्ल

बेन्जीन - 1, 2 - डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल




ऑक्सिलिक अम्ल

एथेन डाइकार्बोइक अम्ल




लैक्टिक अम्ल

2 - हाइड्रॉक्सी प्रोपेनोइक अम्ल




γ - मथिल सारकती है वरीन कार्बोन्डहाइड
 3 - मथिल सारकती है वरीन कार्बोन्डहाइड



एक्रोलीन
 प्रोप - 2 - ईनल


2022 निम्न यौगिकों के IUPAC नाम दीजिए ।




प - मथिल पेंटेनल



ब्यूट - 2 - ईनल




3, 3 - डाइमथिल ब्यूटेनोइक अम्ल



सैलैन्डहाइड

बेंजीन - 1, 2 - डाइकार्बोन्डहाइड




2 - मथिल साइक्लो ब्यूटेनोन


NCERT निम्न यौगिकों की संरचनाएँ लिखिए।

2022


(i) α - मथॉक्सिप्रोपिऑनल्डहाइड




(ii) 3 - हाइड्रोक्सी ब्यूटेन




(iii) 2 - हाइड्रोक्सीसाइक्लोपेंटानकार्बोल्डहाइड



(iv) 4 - ऑक्सीपेंटन



(v) 3 - द्वितीयक ब्यूटिल कीटोन






(vi) 4 - क्लोरोक्लोसीक्लोहेक्सेन





एनिडाइड एवं कीटोन के बनने की विधियाँ :

क्या अम्लों के कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन से :


जब किसी क्या अम्ल के कैल्शियम लवण को कैल्शियम फॉर्मेट के साथ गर्म किया जाता है, तब एनिडाइड बनता है कैल्शियम फॉर्मेट के अतिरिक्त किसी अन्य कैल्शियम लवण को गर्म करने पर कीटोन बनता है।







एल्काइनों का जलयोजन :


एल्काइनों का HgSO_4 (Hg^{2+}) आयन की उपस्थिति में H_2SO_4 (H^+) द्वारा जलयोजन होकर ऐलिडहाइड एवं कीटोन बनते हैं।





एथाइन
(एसीटीन)



ऐसिटैलिडहाइड




प्रोपाइन




ओजोनी अपघटन :

ओजोनी एन्कीनों के द्विबंध पर आक्रमण करके ओजोनाइड बनाता है, जिसका अपघटन होने से एल्डिहाइड एवं कीटोन बनता है।




2-मीथिल ब्यूट-2-ईन



ओजोनाइड

$-\text{ZnO}$

$\text{Zn/H}_2\text{O}$



एसीटोन


एसीटल्डिहाइड

★ ★ ★ रोजैन मुण्ड अभिक्रिया :


जहाँ जहाँ एसीटक्लोराइड या वैंगोइल क्लोराइड के उबलते विलयन प्रभावित करने पर एल्डिहाइड या वैंगोल्डिहाइड बनता है।



एसीट क्लोराइड






एल्डिहाइड



एसेटिल क्लोराइड

एसीटल
हाइड्राइड




सेंजॉइड क्लोराइड

सेंजॉलिडहाइड


*** स्टीफन अभिक्रिया :

ऐलिकल सायनाइड का स्टेनस क्लोराइड (SN₂) एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अपचयन होकर ईमाइन बनता है, जो जल अपघटित होकर ऐल्डहाइड देता है।





स्टेनस क्लोराइड

स्टेनिक क्लोराइड



मेथिल सायनाइड


ईमाइन
ऐल्डमीन हाइड्रोक्लोरिक क्लोराइड



एसीटलिडहाइड


★ इस्टर अभिक्रिया :

CS_2 (कार्बन डाई सल्फाइड) या CCl_4 (कार्बन टेट्रा क्लोराइड) में क्रोमिल क्लोराइड द्वारा टॉलूईन का ऑक्सीकरण होकर **क्रोमियम संकुल** बनता है, जिसका जल अपघटन होने पर **बेंज़ील्डहाइड** बनता है।



★ गैटरमान - कोच संश्लेषण :

जब बेंज़ीन की अभिक्रिया कार्बन-मोनो-ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ निज़म $AlCl_3$ की उपस्थिति में कराने पर **बेंज़ील्डहाइड** बनता है।



रासायनिक गुण

यूरोट्रोपीन का बनना :


फॉर्मलिडहाइड अमीनिया से क्रिया कर हेक्सामेथिलीन टेटरामिन (यूरोट्रोपीन) बनता है।



फॉर्मलिडहाइड

हेक्सामेथिलीन
टेटरामिन
(यूरोट्रोपीन)
(रासायनिक नाम)

यूरोट्रोपीन की संरचना :




उपयोग :

इसका उपयोग मूत्र नलिका संक्रमण में औषधि के रूप में किया जाता है।


* परकिन अभिक्रिया :

जब बेंजोइलहाइड की अभिक्रिया ऐसीटिक ऐनहाइड की सोडियम ऐसिट की उपस्थिति में सिन्नेमिक अम्ल बनता है। इस अभिक्रिया को परकिन अभिक्रिया कहते हैं।




क्लेज्म संघनन :

ऐसीटिक ऐलडहाइड (बेंजोइलहाइड) तनु द्वार की उपस्थिति में जब α हाइड्रोजन युक्त ऐलिफैटिक ऐलडहाइड अथवा कीटोन के साथ संघनित होता है, तो α β असंतृप्त ऐलडहाइड या कीटोन बनता है। इस अभिक्रिया को क्लेज्म संघनन कहते हैं।





* वैंगोइन संघनन :

वैंगोइन संघनन की बेंजोइलहाइड को जब एन्कोहॉलीय पोटैशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड के साथ गर्म किया जाता है, तो बेंजोइलहाइड के दो अणु संघनित होकर वैंगोइन बनते हैं। इस अभिक्रिया को वैंगोइन संघनन अभिक्रिया कहा जाता है।



★ પેન્ડાંત સંબંધન :


वह अभिक्रिया जिसमें दो सामान्य या विभिन्न कार्बनित यौगिकों (एन्डहाइड या कीटोन) के अणु, जिनमें α -हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, तनु द्वारा जैसे - NaOH या $\text{Ba}(\text{OH})_2$ आदि की उपस्थिति में संयुक्त होकर नया यौगिक बनता है, जिसे ऐल्डोल को गर्म करने पर $\alpha \beta$ असंतृप्त ऐन्डहाइड या कीटोन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ऐल्डोल संघनन कहते हैं।




ऐन्ड्रॉइड की प्रणाली का अन्तर्गत स्तर है। α - हाइड्रोजन के कारण कीटाण


क्रॉस ऐल्डॉल संयोजन :

कक्षीयित यौगिकों के दो एक समान अणुओं के बीच संयोजन न कराके अलग-अलग अणुओं के बीच संयोजन कराया जाए, तो उसे मिश्रित या क्रॉस ऐल्डॉल संयोजन कहते हैं। सामान्यतः जब एक अणु α हाइड्रोजन विहीन हो तो ऐसा संयोजन महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जब दोनों अणु α -हाइड्रोजन युक्त होते हैं, तब यह उत्पाद बनते हैं।


Q* कैनिज़ारी अभिक्रिया :

अल्फा (α) हाइड्रोजन विहीन ऐल्डहाइड जैसे - HCHO फॉर्मैल्डहाइड या $\text{C}_6\text{H}_5\text{CHO}$ (बेंजैल्डहाइड) आदि पर 50% NaOH की क्रिया कराने पर ऐल्डहाइड का एक अणु उपरत में ऑक्सीकृत होता है और दूसरा अणु ऐल्कोहॉल में अपचयित होता है। इस अभिक्रिया को कैनिज़ारी अभिक्रिया कहते हैं।






Date: / / Page no: 59



विकार्षी विसंक्रिया :


कार्षी विसंक्रिया समूह का निकलना विकार्षी विसंक्रिया कहलाता है। सांझात्मक के साथ गर्म करने पर कार्षी विसंक्रिया अम्ल के सोडियम लवण का विकार्षी विसंक्रिया होता है तथा ऐल्कोन बनता है इस विधि को इयूमा विधि कहते हैं।




(2023) ऐसीटिक अम्ल से आप निम्नलिखित कैसे प्राप्त करेंगे ?


- ★
- (i) ऐसीट अमाइड
 - (ii) ऐसीटिक ऐनहाइड्राइड
 - (iii) ऐथिल ऐसीटेट
 - (iv) हाइड्रोक्सी ऐसीटिक अम्ल
 - (v) ऐसीटिल क्लोराइड

(ii) ऐसीट अमाइड







(ii) ऐसीटिक ऐनहाइड्राइड




(iii) एथिल ऐसिरेट



(iv) ट्राइ-क्लोरी ऐसिटिक अम्ल



(v) ऐसीटिल क्लोराइड




करा होता है, जब ऐथेनल का अपचयन किया जाता है ?


- (i) क्लेमेंशन अपचयन
- (ii) वॉल्फ - किर्नर अपचयन
- (iii) LiAlH₄ द्वारा
- (iv) Na-Hg / H₂O द्वारा

★ (i) क्लेमेंशन अपचयन :

जब ऐल्डिहाइड या कीटोन को प्लैंक अमलगम (Zn-Hg) और सांद्र HCl के साथ गर्म किया जाता है, तो कार्बोनिल समूह मैथिलीन समूह (CH₂) में अपचयित हो जाता है और ऐल्केन बनता है।




OR




(ii) वॉल्फ - किर्नर अपचयन :

जब कार्बोनिल यौगिक जैसे - ऐल्डिहाइड तथा कीटोन को हाइड्रायन के साथ प्रथम द्वार जैसे - ROM की उपस्थिति में उच्च वक्थनांक वाले विनायक जैसे - एथिलीन ग्लाइकोल के साथ गर्म किया जाता है, तो

कार्बोनिल समूह मैथिलीन समूह (CH_2) में अपचयित हो जाता है और ऐल्केन बनता है।




Q4




(iii) LiAlH_4 द्वारा अपचयन :

एल्डहाइड तथा कीटोन LiAlH_4 के साथ ईथर की उपस्थिति में अपचयन कराने पर ऐल्कोहॉल में अपचयित हो जाते हैं। एल्डहाइड प्राथमिक ऐल्कोहॉल तथा कीटोन द्वितीयक ऐल्कोहॉल में अपचयित होता है।




04


$$(2^0)$$

(iv) $\text{NaHg}/\text{H}_2\text{O}$ द्वारा अपचयन :

उपरिष्ठत में अपचयन की पर्याप्त माध्यमिक ऐल्कोहॉल
देता है।




हेन-वॉल्हाड जेनेन्सकी अभिक्रिया





HVZ अभिक्रिया

कार्बोक्सिलिक अम्लों की लाल फॉस्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन या ब्रोमीन की अभिक्रिया से α -हैलोजेनिकृत अम्ल प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रिया हेन-वॉल्हाड जेनेन्सकी अभिक्रिया कहलाती है।




टिशेन्को अभिक्रिया

यह एक प्रकार की कॅनिजरी अभिक्रिया है। जब दो ऐसीटैल्डिहाइड या दो बेंजैल्डिहाइड ऐल्युमिनियम एथाक्साइड $[(\text{C}_2\text{H}_5\text{O})_3\text{Al}]$ की उपस्थिति में आपस में क्रिया करके एस्टर बनते हैं।



★ टॉर्नेन परीक्षण (रजत दर्पण परीक्षण)

अमीनिकल या अमीनियम सिल्टर नाइट्रेट का विलयन टॉर्नेन अभिकर्मक कहलाता है। जब टॉर्नेन अभिकर्मक को ऐल्डहाइड ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है तथा Ag^+ आयन Ag में अपचयित हो जाते हैं और परखनली की दीवार पर चमकदार रजत दर्पण बनाता है।



Note: कीटोन यह परीक्षण नहीं देते हैं।

★ फैहनिंग परीक्षण

सोडियम , पोटेशियम , टार्ट्रेट व संकुचित क्षारीय कॉपर सल्फेट का विलयन फैहनिंग विलयन कहलाता है। जब ऐल्डहाइड को फैहनिंग विलयन के साथ गर्म करते हैं, तो ऐल्डहाइड का ऑक्सीकरण हो जाता है तथा क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। यह फैहनिंग परीक्षण कहलाता है।

ROH - 78°C
R-COOH - 118°C

Date: / / Page no: 66



एल्डिहाइड

फॉर्मिंग
परिष्करण


कार्बोक्सिलेट
आयन

लाल
अवक्षिप्त

Note: कीटन तथा ऐरोमेटिक एल्डिहाइड (बेंजोएल्डिहाइड) यह परीक्षण नहीं देते हैं।

✓ कार्बोक्सिलिक अम्लों के वलयनांक समान अणुभार वाले ऐल्कोहॉलों की अपेक्षा अधिक होते हैं, क्यों?

कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्रीय द्वितीयक के रूप में होते हैं। यह अणुओं के मध्य अंतरा हाइड्रोजन बंध बनने के कारण होता है। अम्लों के हाइड्रोजन बंध ऐल्कोहॉल के हाइड्रोजन बंध की तुलना में अधिक प्रबल होते हैं। इसी कारण कार्बोक्सिलिक अम्लों के वलयनांक समान अणुभार के ऐल्कोहॉलों से उच्च होते हैं।




हाइड्रोजन बंध


चक्रीय द्वितीयक

✓ फॉर्मिलिडाइड एसिटिलिडाइड और एसीटोन में से कौन - सा यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है और क्यों ?


फॉर्मिलिडाइड, एसिटिलिडाइड और एसीटोन की क्रियाशीलता का निर्धारण कार्बोनिल समूहों के साथ जुड़े समूहों की प्रकृति के आधार पर होता है। कार्बोनिल समूहों के कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होने कारण यौगिक अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। यदि कार्बोनिल समूह $>C=O$ के साथ इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले $[-I]$ प्रभाव वाले समूह जुड़े होंगे, तो वे कार्बोनिल समूह वाले कार्बन की इलेक्ट्रॉन ग्यूनता को और बढ़ा देंगे, जिससे यौगिक बहुत अधिक क्रियाशील हो जाएगा। इसके विपरीत यदि कार्बोनिल समूह के साथ इलेक्ट्रॉन देने वाले $[+I]$ प्रभाव वाले समूह जुड़े होंगे, तो कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता को कम कर देंगे। CH_3 समूह का $+I$ प्रभाव होता है। अतः उपर्युक्त तीनों यौगिकों की क्रियाशीलता का क्रम नीचे दिए अनुसार होगा —



फॉर्मिलिडाइड



एसिटिलिडाइड



एसीटोन





- I प्रभाव - F, Cl, Br, I
CN NO₂

+ I प्रभाव - सभी ऐल्किल समूह
C₂H₅


एन्डोहाइड और क्वाटीन समूहों के राैगिक में अंतर लिखिए ।

गुण	एन्डोहाइड	क्वाटीन
1. रीफ अभिकर्मक से क्रिया →	यह गुलाबी रंग देता है ।	यह कोई रंग नहीं देता है ।
2. फेहलिंग विलयन के साथ क्रिया →	लाल भूरा (Cu ₂ O) का अवक्षेप देता है ।	यह कोई अवक्षेप नहीं देता है ।
3. टॉलेन अभिकर्मक के साथ क्रिया →	यह रजत दर्पण परीक्षण देता है ।	यह रजत दर्पण परीक्षण नहीं देता है ।
5. क्लोरीफॉर्म के साथ क्रिया →	कोई क्रिया नहीं देता	यह क्लोरीटीन देता है ।
4. अपचयन →	इसके अपचयन से प्राथमिक ऐल्कोहॉल बनते हैं ।	इसके अपचयन से द्वितीयक ऐल्कोहॉल बनते हैं ।

[2023] निम्न अभिक्रियाओं पूर्ण कीजिए ।



AlHCl-(Bu)₂ or DIBAL-H असहस्युटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड



[फ्रिडल क्राफ्ट ऐसीलीकरण]

[2024]

निम्नलिखित अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण सहित लिखिए।

- (i) कैनीजरी अभिक्रिया
(ii) रीजैनमुंड अभिक्रिया


अथवा

क्या होता है, जब (रासायनिक समीकरण सहित लिखिए)


(A) बेंजीन की ऐसील क्लोराइड के साथ निर्जल ऐल्युमिनियम क्लोराइड (AlCl_3) उत्प्रेरक की उपस्थिति में करके जाती है।

(B) बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन - मैनो - ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl_3 की उपस्थिति में करके जाते हैं।

[फ्रिडल क्राफ्ट ऐसीलीकरण]



(B)



बेन्जीन





[वैल्मन की च संश्लेषण]



बेन्जाल्डहाइड

हैलोफॉर्म अभिक्रिया
(आर्यडीफॉर्म अभिक्रिया)


जब ऐलिडहाइड तथा केटोन, जिनमें CH_3CO समूह उपस्थित होता है, वह I_2 तथा $NaOH$ के साथ क्रिया करके आर्यडीफॉर्म के पीले अवक्षेप देते हैं। यह अभिक्रिया हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है।


सोडियम
हाइपोआर्यडाइड

एसीटोन
(प्रॉपेनोन)

आर्यडीफॉर्म
(पीले अवक्षेप)

निम्नलिखित शैिक युगलों में विभेद करने के लिए
सर्वत रासायनिक परीक्षणों को दीजिए।

- I प्रोपेनल एवं प्रोपेनॉन
- II ऐसीटोफीनॉन एवं बेंजोफीनॉन
- III फेनॉल एवं बेंजोइक अम्ल
- IV पेंटेन-2-ऑन एवं पेंटेन-3-ऑन
- V बेंजिलिडहाइड एवं ऐसीटोफीनॉन
- VI ऐथेनल एवं प्रोपेनल




टॉलेन अभिकर्मक मिलाकर प्रोपेनल की गर्म
करने पर सफ़त दर्पण बनता है, जबकि प्रोपेनॉन
क्रिया नहीं करता है।


अथवा

I_2 तथा NaOH मिलाने पर प्रोपेनॉन आयोडीफॉर्म
बनने के कारण पीला अवक्षेप देता है, जबकि प्रोपेनल
क्रिया नहीं करता है।


II ऐसीटोफीनॉन



बेंजोफीनॉन





I_2 तथा $NaOH$ मिलाने पर एसीटीफीनोन आरडीफॉर्म का पीला अवक्षेप देता है, जबकि बेंजोफीनोन नहीं देता है।




दोनों में अलग-अलग उदासीन फेरीक क्लोराइड ($FeCl_3$) विलयन मिलाने पर फीनॉल बैंगनी रंग देता है, जबकि बेंजोइक अम्ल नहीं देता है।

दोनों प्लूरीय विलयन में अलग-अलग कैल्शियम साइडो (Na_2CO_3) मिलाने पर बेंजोइक अम्ल तीव्र बुदबुदाहट के साथ CO_2 गैस देता है, जबकि फीनॉल नहीं देता है।



दोनों में अलग-अलग I_2 तथा $NaOH$ मिलाने पर पेंटेन - 2 - ऑन आरडीफॉर्म का पीला अवक्षेप देता है, जबकि पेंटेन - 3 - ऑन नहीं देता है।

बेंजीन का ऐसीटिलेशन $\rightarrow$ यह फ्रिडल क्रॉफ्ट ऐसीटिलेशन है।



Date: / / Page no:

बेंजीन



ऐसीटिल
क्लोराइड

ऐसीटोफीनोन

च

बेंजालिडहाइड

ऐसीटोफीनोन




टॉलेन अभिकर्मक मिलान पर बेंजालिडहाइड को गर्म करने पर रजत वर्ण देता है, जबकि ऐसीटोफीनोन नहीं देता है।

च ऐथेनल ($\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{H}$), प्रोपेनल ($\text{CH}_3-\text{CH}_2-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{H}$)

I_2 तथा NaOH मिलान पर ऐथेनल आयोडोफॉर्म के पीले अवक्षेप देता है, जबकि प्रोपेनल नहीं देता है।

जीवात्मक अभिक्रिया :-

इस अभिक्रिया में जब फीनॉल के अति उच्च ताप पर फॉर्मलिडहाइड दी या दी से अधिक अणुओं को अति उच्च ताप पर फॉर्मलिडहाइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, तो संगुनित अणु का निर्माण होता है जिस बेंक लाइट कहते हैं।




फीनॉल

बेंक लाइट

प्रयोगशाला में ऐसीटोन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। नामांकित चित्र एवं रासायनिक समीकरण भी दीजिए।



ऐसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि :

प्रयोगशाला में ऐसीटोन निम्न कैल्शियम ऐसीटेट के शुष्क आसवन से बनाया जाता है।



चित्र

चित्रानुसार उपकरण तैयार करके कॉच या धातु के रिटॉर्ट में निजलि कैल्शियम ऐसीटेट लेकर गर्म करने हैं। ऐसीटोन की वाष्प बनती है, जो संयोजित होकर ग्लास में एकत्रित हो जाती है। यह ऐसीटोन अशुद्ध होता है। इसे संतृप्त NaHSO_3 विलयन के साथ मिश्रित कर प-5 वॉट के लिए रख दी है, जिससे ऐसीटोन सोडियम बाइसल्फाइट के क्रिस्टल बनते हैं। इन्हें पृथक् करके Na_2CO_3 विलयन के साथ मिश्रित कर आसवन करने हैं। शुद्ध ऐसीटोन प्राप्त होता है। इसीलिए इसे इसमें थोड़ा प्लम अभी भी होता है। इसीलिए इसे निजलि CaCl_2 से सुखाकर पुनः आसवन करने हैं। 56°C पर शुद्ध ऐसीटोन आसवित होता है।




शीघ्र फिरका विधि से ऐसीटिक अम्ल कैसे बनाते हैं? ऐसीटिक अम्ल की क्लोरीन तथा फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड से अभिक्रिया रासायनिक समीकरण देकर समझाइए।

OR

ऐसी अम्ल बनाने की शीघ्र फिरका विधि की सविनय समझाइए। इसके 4-5 प्रमुख गुण और उपयोग बताइए।

शीघ्र सिरका विधि

इस विधि में ऐल्कोहॉल के तनु विलयन का ऑक्सीकरण वायु के द्वारा माइक्रोडर्म ऐसीटी बैक्टीरिया की उपस्थिति में किया जाता है।






इस विधि में एक बाल्टीनुमा पात्र में जिसके निचले भाग में कई छेद हो पुराने सिरके से भीगी लड़की की छलिन भरकर ऊपर एथिल ऐल्कोहॉल का 10% विलयन (जिसमें थोड़ा अमोनियम सल्फेट मिला हो) धीरे-धीरे नीचे गिराने हैं। इसमें अमोनियम सल्फेट बैक्टीरिया के भोजन के रूप में कार्य करता है। तब नीचे तनु ऐसीटिक अम्ल या सिरका एकत्रित हो जाता है। इस तरह प्राप्त अम्ल को तब तक कई बार ऊपर से डालने हैं, जब तक ऐल्कोहॉल का ऑक्सीकरण पूर्ण न हो जाए। इस प्रकार ऐसीटिक अम्ल का सांद्रण भी हो जाता है।

रासायनिक गुण


1. Cl_2 से क्रिया :

ऐसीटिक अम्ल क्लोरीन, सूर्य प्रकाश या उच्च ताप पर लाल फॉस्फोरस की उपस्थिति में क्रिया करके पर मोनो, डाई एवं ट्राइक्लोरो ऐसीटिक अम्ल बनाते हैं।





2. PCl_5 से किया :



अपयोग :

- (i) प्रयोगशाला में अभिकर्मक व विनायक के रूप में ।
- (ii) सिरके के रूप में आचार, चटनी आदि बनाने में ।
- (iii) मेथिल ऐसीटेट, एथिल ऐसीटेट तथा अन्य एस्टर बनाने में ।

सैलिसिलिक अम्ल से एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल
(ऐस्प्रीन)

सैलिसिलिक अम्ल का एसिलिकरण करने पर
एसिटिल सैलिसिलिक एसिड (ऐस्प्रीन) प्राप्त होता
है ।

